

Een paar losse coleopterologische aantekeningen

door

D. MAC GILLAVRY

1. *Colorado kever*. Uit een dezer dagen ontvangen brief uit Bretagne verneem ik, dat het daar wemelt van de coloradokevers, die met hun larven zichtbare schade aanrichten aan de aardappels. Er worden generlei maatregelen genomen ter bestrijding. Er dreigt dus in 1951 weer een grote invasie van coloradokevers uit het Zuiden te zullen komen.

2. Naar aanleiding van het bericht van Dr DE FLUITER over *Monohammus* meen ik, dat wij behalve op de twee door DE FLUITER genoemde soorten ook nog moeten letten op het mogelijk verschijnen in ons land van *M. sartor* F., zie EVERTS 2 : 375. Nu vond ik in de Franse literatuur de opmerking, dat o.a. in het bos van Fontainebleau nog vele niet opgeruimde stammen liggen van in de vorige oorlog ontwortelde en beschadigde bomen van allerlei soorten en dat werd geconstateerd, dat zich daarin graag *Monohammus*-soorten ontwikkeld hadden, die daar vroeger òf niet òf zeer zeldzaam voorkwamen. Nu zijn er in ons land ook plekken waar nog dergelijk materiaal ligt na de windhoos, die indertijd Borculo teisterde. Ik maakte toen een aantekening over de mogelijkheid, dat daardoor de kans groot is, dat zich ook daar *Monohammus*-soorten zouden kunnen ontwikkelen. Door de nu pas over ons land geheerst hebbende windhoos en door de oorlog zijn er weer vele beschadigde en van hun toppen beroofde bomen, die nog lang niet alle opgeruimd zijn. Dit zijn dus ook plaatsen, waar vermeerdering van *Monohammus* zou kunnen geschieden. Door de vele verhuizingen uit de laatste jaren weet ik nu niet of die aantekening nog terug te vinden zou zijn of verdwenen is. Toch meen ik, dat ik indertijd de heer VAN DER WIEL op deze mogelijkheid attent maakte. Ook geloof ik, dat in de nieuwste monografie over de boktorren van Frankrijk door L. M. PLANET, waar men de boktorren moet herkennen uit de afbeeldingen, ook op de uitbreiding van *Monohammus* gewezen wordt. Ik raad dus Dr DE FLUITER aan eens in die Franse literatuur te snuffelen.

3. *Balaninus*. Voor \pm een jaar schreef A. STÄRCKE mij, dat hij vele eikels had onderzocht en dat behoudens een uitzondering alle door *Balaninus* aangetaste eikels de Hollandse betroffen. Nu was in Amerongen in 1948 geen één Hollandse eikel tot ontwikkeling gekomen, terwijl in 1949 uitsluitend Hollandse eikels en wel zeer grote exemplaren voorhanden waren. Hoe dit in den Dolder was, blijkt niet uit STÄRCKE's brief.

Heelsum, „Bergzicht”, September 1950.

Acherontia atropos L. Aan de in het Trekverslag vermelde exx. kunnen 2 volwassen rupsen toegevoegd worden, die ik half Septr. en 6 Octr. uit Marssum bij Leeuwarden ontving. Ze zijn in de aarde verpopt en werden vorstvrij overwinterd, maar gingen toch dood.

G. VAN MINNEN, Mendelssohnstraat 35, Leeuwarden.

[Via de heer TOLMAN kreeg ik nog bericht van Mevr. CHR. STEHOUWER-WEYERSE (Rozenburg), dat in 1949 vijf poppen gevonden waren op een aardappelveld tegen „de Beer”. De totaalstelling wordt nu dus : 23 vlinders, 5 rupsen, 12 poppen. — Lpk.]