

Tenslotte volgt hieronder een korte lijst van namen, die als synoniemen moeten vervallen of door oudere namen vervangen worden.

- a. *Stigmella lusatica* Schütze = *St. lapponica* Wck.
- b. *Lithocolletis amyotella* Dup. = *mülleriella* Z.
- c. „ *faginella* Z. = *maestingella* Z.
- d. „ *platanoidella* de Joann. = *joannisi* LeMarch.
- e. „ *spinicolella* Z. = *pomonella* Z.
- f. „ *tenella* Z. = *tenerella* de Joann.
- g. *Eupista apicella* Stt. = *striatepennella* Nyl. & Tengstr.
- h. „ *bicolorella* Stt. = *binderella* Koll.
- i. „ *graminicolella* Hein., *inflatae* Stt. en *nutantella* = *silenella* H.S.
- j. „ *nigricella* Stt. = *serratella* L.
- k. „ *serenella* Z. = *crocinnella* Tengstr.
- l. „ *flavaginella* auct. = *sternipennella* Zett.
- m. „ *benanderi* Kan. = *flavaginella* Z.
- n. „ *annulatella* Tengstr. = *laripennella* Zett.
- o. *Chrysoclista bimaculella* = *lathamella* Bainbr. Fletch.
- p. *Steganoptycha obtusana* Hw. = *Ancylis obtusana* Hw. De genitalia van ♂ en ♀ stemmen overeen met die van *A. derasana* Hb. waarmee de vlinder ook grote gelijkenis vertoont. (Zie PIERCE : Tortricidae, pl. XVIII, 1922).
- q. *Epiblema semifusca* Sph. = *piceana* Hw.
- r. *Bactra scirpicolana* Pierce = *robustana* Chr.

De achterste naam is de nu geldige.

Villieria, Pretoria, Zuid-Afrika, 260, 18e Laan, Juli 1950.

Iphiclides podalirius L. Een buitengewoon gelukkige vangst maakte de heer H. VAN OORSCHOT 28 Mei 1950, toen hij op de hei bij Bussum een koningspage in zijn net kreeg. Het dier is al iets afgevlogen en een van de staartjes der achtervleugels is afgebroken. Het bevindt zich nu in de collectie van de heer H. J. L. T. STAMMESHaus te Amsterdam. — Lpk.

Tweede generatie van Habrosyne piritoides Hufn. (derasa L.). Met *piritoides* had ik de volgende ervaring : gekweekt ab ovo, kreeg ik ongeveer de helft uit in de tweede helft van September, terwijl de rest van de poppen over blijft liggen.

J. LUKKIEN, Putmanstraat 48, Deventer.

Het raadsel van Euphyia bilineata L. (Lep., Geom.) Vergelijk Cat. Ned. Macr. IX : (689)—(690). 1 Juni 1949 ving ik een ♀ bij Soest. 13 Juni begon het eieren te leggen. Deze waren onbevruucht. 25 Juni 1950 ving ik 2 ♀♀ in de Achterhoek. Door ze af en toe met wat suikerwater te voeren, bleven ze volle 5 weken in leven en begonnen toen (begin Augustus) beide eieren te leggen. Ook deze waren weer onbevruucht ! Ik begin me nu af te vragen, hoe lang het dan wel duurt, voor een *bilineata*-♀ tot copulatie overgaat. Het enige, wat ik thans zeker weet, is, dat de eieren door deze soort los op de bodem gelegd worden en in de natuur dus wel onder het vliegen uitgestrooid worden. Ik hoop, dat in het komende seizoen ook anderen zullen trachten eieren van deze algemene vlinder te krijgen en dan niet zullen nalaten hun bevindingen mee te delen. — Lpk.