

Behangersbijen

door

G. VAN MINNEN

1. Deze zomer (1950) ving ik weer twee exx. van *Megachile ericetorum* Lep. in mijn eigen tuintje (7 Juli en 27 Aug.). Ik had er al één van 13 Aug. 1944. Het zijn alle wijfjes. Ze bezochten de bloemen van *Lathyrus latifolius* L. FRIESE vergelijkt de nestbouw met die van *Osmia rufa* L., die hier veel voorkomt en waarvoor in deze buurt voldoende klei voorhanden is. Maar als *ericetorum* ook hars er bij gebruikt (volgens FERTON), is het hier toch niet zo geschikt. Alleen wat druppels uit mijn vurenhouten tuindeuren en misschien ergens een eenzaam naald-boompje zouden de grondstof kunnen leveren. Weten we al meer van die harskwestie?

2. Verder bezit ik een wijfje van een *Megachile*-soort (23-8-'42 in eigen tuin), dat volgens de tabel van BOUWMAN het meest op *willughbiella* K. lijkt, maar de gladde middenstreep op de clypeus ontbreekt. De thorax is roodbruin behaard, zonder zwart, dus dan ook geen *ligniseca* K. De buikschuier is nagenoeg geheel rossig. De echte *willughbiella* van mij heeft een duidelijke middenstreep en geelbruine thorax-beharing en veel zwarte verzamelharen.

3. Mijn *Megachile centuncularis* L. hebben geen van alle een spoor van een gladde middenstreep op het kopschild. Is dit een fout in de tabel van BOUWMAN (De Levende Natuur 29)?

4. *Megachile maritima* K. vloog veel op Schiermonnikoog op 18 Juli 1948, vooral mannetjes.

5. *Megachile analis* Nyl. zag ik met berkenblad bouwen in Appelsga (24-7-1945). Dus geen schors zoals in Finland.

Dit zijn enige opmerkingen over mijn eigen behangersbijen. Misschien is het niet belangrijk, maar er wordt zo weinig geschreven over de faunistiek en de biologie van deze groep, dat men nooit zijn eigen vondsten op belangrijkheid kan toetsen. Zou iemand niet eens een samenvatting kunnen geven van wat er voor ons land aan vindplaatsen en verdere bijzonderheden bekend is? Het is juist een mooi afgerond groepje en het wekt anderen op om er in door te gaan. Ook in andere insectenfamilies en -orden moet het mogelijk zijn een interessante groep te behandelen!

Leeuwarden, Fonteinstraat 26, September 1950.

Vlindervangsten najaar 1950. Met de vangst op licht is het hopeloos slecht dit najaar, hoewel er mooie avonden genoeg zijn. Tot nog toe (16 October) heb ik n.b. tevergeefs uitgekeken naar exx. van de geslachten *Dasycampa*, *Conistra*, *Anchoscelis*, *Tiliacea*, *Agrochola*, *Cirrhia* en *Citria*. De eerste exx. van *Oporinia dilutata* Schiff. verschenen op 12 Oct., tot nu toe in klein aantal.

H. COLDEWEY, „Nieuw Veldwijk”, Twello, K 73.

Van de Redactie. De Redactie verzoekt dringend om regelmatige toezending van copy, daar het anders niet zeker is, dat de door velen gewaardeerde maandelijkse publicatie van de Ent. Ber. gehandhaafd kan blijven.