

depressus. ♂ ♂ en ♀ ♀ waren in de verhouding van 3 tot 2 aanwezig, de ♂ ♂ alle met zwart achterlijf, de ♀ ♀ alle met roodgeel achterlijf. Alle exemplaren hadden in afwijking met de opgave van EVERTS (Col. Neerl. 2 : 333) het lichaam zacht behaard.

H. PRAKKE, Bosweg 103, Apeldoorn.

Merkwaardige Hymenoptera-vondst. 14 Aug. 1950 verzamelde ik op de Bemelerberg (Z.-L.) een ♀ van *Rhophites quinquespinosus* Spin. Deze soort was op het Entomologisch Museum te Amsterdam nog niet uit Nederland bekend.

SCHMIEDEKNECHT (1930) geeft als verspreidingsgebied op voor *R. quinquespinosus*: Midden-Europa, noordelijk tot Zweden. BENOIST (1940) geeft deze soort ook op voor geheel Frankrijk.

H. WIERING, Govert Flinckstr. 16, Zaandam.

Waar komen in ons land knijten voor? Uit eigen ervaring weet ik, dat ze zeer talrijk zijn in het bos van Linschoten, waardoor DE MEYERE er verscheiden exemplaren kom vangen, die op mijn hand zaten. DE MEYERE was zelf een van die zeldzame mensen, die ongevoelig zijn voor knijten en hij heeft nooit geweten hoetalrijk ze in het Linschoter bos waren, totdat hij er eens in mijn gezelschap was.

Uit persoonlijke ervaring weet ik ook dat zij in de tuin van hotel „de Veluwe” tegenover het station van Nunspeet zijn.

Als ik goed gevolgd heb wat er door de radio verteld wordt, zijn ze overtalrijk in het watergebied van Friesland. Of ze er reeds vroeger waren valt niet uit te maken, maar ze schijnen hun hoofdkwartier gevestigd te hebben in het herbouwde jachtslot van de Graaf van Nassau, nu het hoofdkwartier van de Commissaris der Koningin.

Ook in de Oosteinderpoelpolder te Aalsmeer zijn ze voldoende talrijk om het 's avonds rustig buiten zitten meestal onmogelijk te maken. Er schijnen tegenwoordig DDT praeparaten te zijn, waar de knijt niet tegen kan, maar vroeger moest men wel genoeg levertraan in de huid hebben om het tegen de knijt te kunnen bolwerken.

Wie weet nog meer vindplaatsen van de knijt?

D. MAC GILLAVRY, „Bergzicht”, Heelsum.

[Knuiten of knijten zijn, zoals Dr KRUSEMAN mij meedeelde, kleine mugjes behorende tot de familie der *Heliidae* of *Ceratogonidae*. De volksnamen worden slechts zeer plaatselijk gebruikt en staan dan ook in geen van mijn beide Nederlandse woordenboeken, noch in OUDMANS' Nederl. Ins. Vooral in moerassige streken zijn de mugjes zeer gewoon. Het zijn deze dieren, welke zo allergemeenst kunnen steken, als men tussen het riet bezig is. — Lpk.]

Correcties. p. 155, r. 4 en 6 v. o. SIETZ moet zijn SEITZ. p. 180—184. Fauna nov. moet 6 keer veranderd worden in Faunae nov. p. 190, r. 3 v. b. bassing moet zijn : bassin.