

d/ *Achlya* Billb., 1820; genotype, *A. flavicornis* (L.)

2. *Axiinae* (subfamiliotype, *Axia* Hb.)

3. *Dilobinae* (subfamiliotype, *Diloba* Bsdv.)

e/ *Diloba* Bsdv., 1840, nom. conservandum; type *D. caeruleocephala* (L.)

Note. "*Eutethea* Grote" (a manuscript name = nom. nud.), type *Tethea fluctuosa* (Hb.), is not included in the above survey both for taxonomical and nomenclatural reasons. I consider *Asphalia* Hb., 1821, type *Achlya diluta* (Fabr.), and *Polyploca* Hb., 1821, type *Achlya ridens* (Fabr.), merely as subgenera of the genus *Achlya* Billb., 1820.

Literature

BRYK, F., 1942, Entomological Results from the Swedish Expedition 1934 to Burma and British India. Lepidoptera: *Thyatiridae* J. B. Smith. Gesammelt von RENÉ MALLAISE, Ark. Zool. 34 A (11): 1-16.

GROTE, A. R., 1907, Die Gattungsnamen der europäischen Noctuiden, Allg. Zschr. Entomol. 7: 395-400.

PACLT, J., 1945, O systému a nomenklature vlnocárnic, Entomol. Listy 9: 19.

—————, 1947, Revise nomenklatury motýlich celedi fauny CSR. Casop. csl. Spol. entomol. 44: 37-44.

—————, in litt., Proposed suspension of the Règles for *Episema* Ochs., Bull. zool. Nomencl., Z. N. (S.): 332.

TAMS, W. H. T., 1939, Changes in the generic names of some British moths, The Entomologist 72: 66-74.

Bratislava 9, Lamacská cesta 5, Czechoslovakia, October 1950.

***Osmylus fulvicephalus* Scop., 1763 (*chrysops* L., 1767) (Neur.).** Tijdens een excursie in de omgeving van Weerselo (Ov.) op 18 Juli 1950 maakte ik een exemplaar buit van *Osmylus fulvicephalus* Scop., de enige inlandse *Osmylide*. Het is een grote zwartbruine gaasvlieg met fraaie zwarte vlekken op de vleugels. Behalve een paar samengestelde ogen heeft *Osmylus* ook een aantal ocellen op de kop.

In het museum te Leiden bevindt zich, naast een enkel ex. van de Veluwe, materiaal van 3 vindplaatsen: Zuid-Limburg meest langs de Geul, Breda en omstr. en de omgeving van Arnhem:

Coll.-ALBARDA: Arnhem (div. ex.), Beekhuizen, Ulvenhout, Ginneken.
Museum-Coll.: Kerkrade (v. D. WEELE 1902), Epen (1938 en '42), Valkenburg (1931), Beekhuizen (1874), Hulshorst (1937, leg. R. A. MAAS GEESTERANUS) (!)

Van de omgeving van Arnhem zijn dus geen recente vangsten aanwezig, noch van Breda, wat echter niet betekent dat het dier er niet meer zou voorkomen.

Wanneer we zien dat het dier gevangen wordt in streken waar loofhout en beken te vinden zijn, althans bij voorkeur, dan mag het ons niet verbazen dat het ook in Twente te vinden is. Mijn exemplaar vloog uit de struiken die over een smal beekje hingen, in de, botanisch meer bekende, Lemselermaten.

K. LEMS, Kon. Wilhelminalaan 38, Leidschendam.

[De collectie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam bezit een vrij behoorlijke serie van *O. fulvicephalus*. Het materiaal is afkomstig uit Twente (Ootmarsum, Denekamp en Vasse), van de Veluwe (Leuvenum, Laag Soeren, Velp en Arnhem), uit de Achterhoek (Winterswijk en Doetinchem) en uit Limburg (Venlo, Valkenburg, Bunde, Epen en Vaals). — Lpk.]