

zwartkoppig spanrupsje over het koele intelligente gelaat van JOHAN DE WIT! Verder afzoeken van de katjes leverde nog 4 *tenuiata*-rupsjes op. Ongetwijfeld moet de vlinder dus nogal in het Bos voorkomen.

DIETZE (1913, Biol. Eup. : 27) schrijft, dat hij de rupsjes alleen op meeldraadkatjes gevonden heeft. De Amsterdamse zaten op stamperkatjes. Het is trouwens niet aan te nemen, dat een *tenuiata*-♀ al in Juli kan uitmaken, welk soort katjes de struiken het volgend voorjaar zullen dragen. Het aantal Nederlandse vindplaatsen van de vlinder is zonder twijfel belangrijk uit te breiden, door in het voorjaar thuis de katjes na te zoeken. — Lpk.

Snelle reactie van vlinders op hogere temperatuur. Zondag 20 Mei, de eerste werkelijk lauwe Zondag van 1951, zwierven we met zijn drieën door het Wiesselse, op zoek naar rupsen van *Rhyparia purpurata* L., die we helaas niet konden ontdekken.

Wel trof het ons, hoeveel vlinders tengevolge van de temperatuurstijging, die de dag tevoren al begonnen was, uit de pop waren gekomen. In een berkenlaantje van een paar honderd meter lang zaten op de heideplanten onder de bomen zeker een paar dozijn kersverse exx. van *Drepana falcataria* L. Verscheiden paartjes in cop. waren hierbij, waarvan het ♀ bij contrôle steeds nog het meconium wegspeerde, zodat het ongetwijfeld pas die morgen was uitgekomen.

Slechts één paartje van *Dr. lacertinaria* L. troffen we in deze laan aan. Zonder nu bepaald een zeldzaamheid te zijn, is deze soort toch ongetwijfeld minder gewoon dan *falcataria*. — Lpk.

Dagvlinders op de lamp. Reeds verschillende malen trof ik bij het lichtvangen zeer algemene dieren op de vanglamp, zoals *Pieris brassicae* L. en *P. napi* L. en 1 maal *Vanessa atalanta* L. en *Gonepteryx rhamni* L., doch steeds wanneer ik vlak bij bomen stond.

In de vroege morgen echter van 7 Juni j.l. nam ik een wel zeer frappant geval waar bij de buitenlampen van de drogerij „Marknesse” C.V. te Marknesse. Dit is een continu-bedrijf, waar natuurlijk 's nachts verschillende lampen buiten moeten branden. Om half drie zag ik een mooi ex. van *Vanessa cardui* L. op een hoogte van ca. 3 m zitten met naar boven dichtgeslagen vleugels. Om het dier te kunnen bemachtigen joeg ik het op met een latje, waarop het even opvloog en vrijwel op dezelfde plaats terugkeerde, weer met de rechterzijde naar de lamp gekeerd. Opnieuw opgejaagd, vloog de vlinder enkele minuten rond tot soms wel een 20 à 30 m van de lamp af en ging toen bij een andere lamp zitten. Nogmaals gebruikte ik de lat en nu vloog het dier pijlsnel rond en verdween uit het gezicht. Ongeveer een half uur later vond ik het aan de achterkant der fabriek terug weer in dezelfde houding en op dezelfde afstand van de lamp, waar ik het nu maar liet zitten. Om 5 uur was het dier verdwenen.

J. WINTERS Hz., Vollenhove.

Correctie. Pag. 297, r. 19 v.b. en p. 303, r. 3 v b. G. VAN ROSSUM moet zijn : G. VAN ROSSEM.