

thuis behorend, werd in 1949 in honderden exemplaren gezien te Zeist, en handhaaft zich daar nog. Voordien uit deze streek onbekend op 1 ex. uit Soest na.

Mijn bedoeling met deze mededeling is het verschijnsel onder de aandacht te brengen van andere verzamelaars en tot hen het verzoek te richten mij melding te willen maken van soortgelijke ondervindingen. Waar de gegevens over de trekvlinders reeds bewerkt worden in de jaarlijkse verslagen van LEMPKE, geldt dit verzoek alleen de inheemse soorten. Bij voorbaat mijn dank.

Zeist, Donkere laan 38, 7 Juni 1951.

Lythria purpurata L. 30 Juni bezochten de heer VAN DER MEULEN en ik de omgeving van Huizen (N.-H.). Het viel ons op zoveel *Lythria*'s als er op de gunstige terreinen (braakliggende landjes, begroeid met grassen en *Rumex Acetosella* L.) aanwezig waren. Bij tientallen joegen we de volkomen verse exx. van de zomergeneratie op. We konden ons niet herinneren ze ooit in zo'n aantal tegelijk gezien te hebben.

Natuurlijk bevonden zich onder de meegenomen exx. enige van de vele uit ons land bekende vormen: een enkele *hilariata* Kitt, een ♀ van f. *trilineata* Stauder, mooie ♂♂ van f. *effusata* Lpk. met nog maar nauwelijks zichtbare banden, en een prachtig ♀ van f. *triangulata* Hanne-mann.

Een van de terreinen was waarschijnlijk een oud heideveld, waar de *Calluna* echter vrijwel geheel verdrongen was door de bochtige smele (*Aira flexuosa* L.). Het hele veld was in een zacht golvende beweging door de sierlijke losse graspluimen op hun lange rode stelen. Hier troffen we nog een ♀ van *Euphyia bilineata* L., f. *stygiata* Kautz, ook geen al te gewone verschijning. — Lpk.

Melanisme bij *Biston strataria* Hufn. Van een serie van 30 *B. strataria*'s behoren er 10 tot de eenkleurige donkere vorm, die door overgangsvormen met de typische vorm verbonden is. Hoewel mij geen cijfers ter beschikking staan en ik op mijn geheugen moet afgaan, meen ik toch dat er een belangrijke toename heeft plaats gehad van de donkere ten opzichte van de lichte vorm in de laatste 40 jaar. Zouden we hier hetzelfde verschijnsel hebben als bij *Biston betularia* L., waar de donkere vorm thans overheersend is?

A. J. GORTER, Donkerelaan 38, Zeist.

[TER HAAR, ± 1904, Onze Vlinders: 332, geeft f. *terrarius* Weymer nog als niet-inlands aan. Helemaal juist was dit wel niet, maar in elk geval bewijst het, dat de vorm toen zo zeldzaam was, dat noch TER HAAR zelf, noch een van zijn medewerkers, er een inlands ex. van gezien had. Nu komen *terrarius* en andere donkere varianten overal onder de soort voor, niet zelden in een zeer behoorlijk percentage. Stellig is de mening van de heer GORTER dan ook juist. — Lpk.]

Separaten te koop. Bij de Bibliotheek, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O., kan een lijst aangevraagd worden van te koop aangeboden separaten, met de prijzen, die er voor gevraagd worden. De lijst moet na 3 dagen teruggezonden worden.