

10. Genus : **Marchaliella** gen. nov.

Type : *Marchaliella*, olim *Chionaspis lepineyi* Bal.

Characters : Closely related to *Chionaspis* Sign., from which it differs mainly : Second lobes notched, but not duplex ; third lobes neither notched nor duplex. Anus very much farther caudad than in *Chionaspis*, where it is always cephalad of vulva. Dorso-pygidial macroducts entirely wanting. In all other characters like *Chionaspis*, also female scale and male puparium.

11. Genus : **Mongrovaspis** gen. nov.

Type : *Mongrovaspis*, olim *Leucaspis quadrispinosa* Green, 1934 (Egypt), also including *M.*, olim *Fiorinia pygosema* Green, 1923 (Tanganyika).

Characters : Closely related to *Leucaspis* Targ. Adult female cryptogynous, elongate elliptic, broadest about middle. Neither lobes nor plates on pygidial margin, which is however produced into at least four long, ensiform caudal processes, about as long as their base is distant from anus. Anus in centro-pygidial position. Genacerores present or absent.

Pygidium of second larva without plates or marginal gland ducts, but with two to three marginal processes, which possibly are true lobes, the median ones prominent, fused at base, with no structures in interval.

Scale of female and male puparium of the *Leucaspis*-type.

12. Genus : **Archangelskaia** gen. nov.

Type : *Archangelskaia*, olim *Parlatoria ephedrae* Ldgr., 1911 (Iran).

Characters : Related to *Parlatoria* Targ. Female oval with retracted pygidium, narrower than body, broad triangular. Pygidium with lobes wanting or with two pairs of lobes : the first larger, broad and bluntly rounded, second ones bluntly pointed, both slightly sclerotic only ; with many broad fimbriate plates, rising from crescent-shaped openings of broad tubular ducts. Two such broad plates in median interval. Genacerores wanting. Female scale elongate oval with cephalad exuviae ; second exuviae very large.

The Hebrew University, Jerusalem, Israël, February 1951.

---

**Heterochila buccata** Fal. (Dipt.). De systematische plaats van deze langs het strand algemeen voorkomende fucicole vlieg is niet duidelijk. SCHINER rekent deze soort nog tot het genus *Heteromyza* Fall. (Helomyzidae), ofschoon hij zegt „sehr zweifelhaft für diese Gattung”. Bij SÉGUY (Faune de France, Acalyptères) wordt de soort tweemaal vermeld nl. bij de Coelopidae als *Oedoparea buccata* Fall. en bij de Dryomyzidae als *Heterochila buccata* Fall. Het gemakkelijke is dat hetzelfde dier onder de naam *Oedoparea* „très commun” is en als *Heterochila buccata* Fall. niet in Frankrijk voorkomend. SÉGUY kent *Heterochila buccata* dus niet, maar het is gemakkelijk na te gaan dat *Oedoparea* een synoniem is van *Heterochila buccata* Fall. Door CZERNY wordt deze soort in het deel Dryomyzidae op goede gronden tot deze, voor een deel fucicole familie gerekend, zodat *Oedoparea buccata* Fall. bij SÉGUY niet alleen van genusnaam moet veranderen, maar ook naar een andere familie moet verhuizen.

W. J. KABOS, Van Baerlestr. 26I, Amsterdam-Z. 1.