

Nederlandsche Hydrachnellae XXVI

door

A. J. BESSELING.

Voor den heer Th. Dresscher, Zoöl. Museum-Amsterdam, werd een collectie watermijten bewerkt, afkomstig van den O. en Z.-Ijsselmeeroever. In het materiaal bevond zich een tweetal nieuwe vormen, dat hieronder beschreven moge worden.

Unionicola crassipes dresscheri nov. var. ♀.

Bij de tot nu toe bekende *U. crassipes* zijn de nappen groot en is de afstand tusschen die nappen, althans op de voorste platen, veel kleiner dan de doorsnede der nappen; soms liggen de nappen tegen elkaar aan. Bij *dresscheri* zijn de nappen klein en is de afstand tusschen deze even groot als de nap-doorsnede.

U. cr. dresscheri is dus een analoge vorm als *U. gracilipalpis parvipora* Lundbl.

Vindplaatsen: IJsselmeeroever achter erf 40, 25.VIII.1942 (No. 37); Zwarte Water bij de doorbreking van den dam voor de vaargeul naar de Goot, 13.VIII.1943 (No. 50).

Forelia variegator intermedia nov. subsp. ♂.

In 1930 werd door Viets een nieuwe *Forelia*-soort, *curvipalpis*, opgesteld naast *F. variegator* (= *parmata*). De ♂♂ van beide soorten bezitten een rugschild; bij *variegator* zijn in dit rugschild aan beide zijden 5 dorsoglandularia opgenomen en bij *curvipalpis* 3. Bij de nieuwe vorm uit de coll.-Dresscher zijn de voorste dgl. vergroeid als bij *variegator*, de achterste dgl. liggen vrij als bij *curvipalpis*. Zoodat het rugschild van dezen nieuwen vorm het midden houdt tusschen die van *variegator* en *curvipalpis*. De haren en borstels aan de 4e pooten zijn gelijk aan die bij *variegator*.

Vindplaats: Kampereiland achter erf 45, open water boven Chara, 18.VIII.1942.

Bij een tegelijkertijd ondernomen revisie van het in mijn bezit zijnde materiaal van *variegator*, in 1932 (Ent. Ber. deel VIII, No. 186, p. 398—399) beschreven onder den naam *parmata*, blijkt mij dat ook dit tot de nieuwe subsp. behoort; reeds de omschrijving: „Het rugschild..... is bij de inlandsche ♂♂ echter duidelijk toegespitst, minstens zoo als bij de soort *curvipalpis* Viets”, was al een aanwijzing hiervoor.

S u m m a r y.

Unionicola crassipes dresscheri nov. var. ♀.

In *U. crassipes crassipes* the genital acetabula are large and on the anterior plates there is but a small distance between them. In *U. crassipes dresscheri* the acetabula are small and there is a distance between them as large as the size, just like in *U. gracilipalpis parvipora* Lundbl.

Forelia variegator intermedia nov. subsp. ♂.

In *F. variegator* the dorsal plate encloses five dorso-glandularia, in *F. curvipalpis* three: the first and the fifth are lying free. In *F. variegator intermedia* the dorsal plate encloses four dorso-glandularia: only the fifth is lying free like in *F. curvipalpis* Viets.

's Hertogenbosch, Koningsweg 30, April 1946.