

slot nog een vangmethode, die ik daar ter plaatse weer toepaste, maar die mij ook vroeger reeds aan vele zeldzame soorten geholpen had. Het zeefsel, dat ik onder de struiken verzamelde of van hun bast afkrabde, spreidde ik in zeer kleine porties uit in een groote, platte, blikken doos en stelde die in de volle zon. Het blik wordt dan spoedig gloeiend heet en zelfs de traagste soorten, zooals *Acalles* en *Echinodera* trachten dan met de grootste snelheid, die zij ontwikkelen kunnen, te ontkomen. Op die wijze ontgaat ons niets van wat in het zeefsel aanwezig is.

Zoo heb ik U dan, bij gebrek aan onze zomerexcursie, die dit jaar helaas achterwege moet blijven, in gedachten medegenomen op excursies naar een gebied, waarnaar ik steeds terugverlang, maar dat ik als gevolg van den chaos en de armoede, die deze oorlog veroorzaakt, wel niet meer terug zal zien. Ik hoop, dat jongeren aan dit terrein, waarvan nog steeds groote gedeelten niet of slecht doorvorscht zijn, opnieuw hun aandacht zullen wijden en dat dan wederom een Nederlander zijn naam moge verbinden aan de kennis van de geheimzinnige fauna der Atlantische eilanden.

Heemstede, Adriaan Pauwlaan 8.

### Eenige interessante vangsten in het Noorden

door

W. L. BLOM<sup>1)</sup>

Op 24 Juli 1943 ving ik te Roden (Dr.) een exemplaar van *Porthesia chrysorrhoea* L. (= *similis* Fuessl.), den Donsvlinder, dat op de *bovenzijde* der voorvleugels precies dezelfde zwarte vegen bezat, welke anders bij deze soort aan de *onderzijde* der vleugels waargenomen worden. Trouwens deze groote, zwartgrijze driehoek was bij dit dier aan de *onderzijde* der voorvleugels eveneens aanwezig.

Dit jaar, 18 Mei 1946, ving ik te Roden een nog weeke, pas uitgekomen *Hydrillula palustris* Hb., extra vroeg (cat. L e m p k e vermeldt 29-5 tot 15-6) en nieuw voor het Noorden.

29 Mei 1946 te Glimmen *Phragmataecia castaneae* Hb., eveneens vroeg (cat. L e m p k e 5-6 tot 30-7) en nieuw voor het Noorden.

24 Aug. 1946 een vijftal *Celaena haworthii* Curt., waaronder de f. *erupta* Frr. te Peize (veen). Jammer genoeg vond ik de goede plaats pas aan het einde van den vliegtijd maar na diverse vergeefsche tochten is vijf stuks op één avond niet slecht en veel belovend voor de toekomst.

Groningen, Westerbinnensingel 3<sup>A</sup> I, 25 November 1946.

### Een zeldzame afwijking van *Porthesia chrysorrhoea* L. (= *similis* Fuessl.)

door

R. WESTERNENG.

Op 28 Juli 1946 ving ik te Castricum op de terreinen van het P.W.N. in de nabijheid van de z.g. Karpervijver een exemplaar van den Donsvlinder, dat in rust was tegen een helmstengel. De voorvleugels van dit exemplaar waren echter geheel zwart bestoven. De heer B. J. L e m p k e, wien ik deze vangst meldde, bevestigde, dat het inderdaad een zwart bestoven exemplaar van *chrysorrhoea* was. Tevens deelde hij mij nog mede, dat dit, voor zoover hem bekend, de tweede vangst van deze afwijking in Nederland was.<sup>2)</sup>

Zaandam, Rosmolenstraat 108 A, Oct. 1946.

<sup>1)</sup> Zie ook het volgende artikel.

<sup>2)</sup> Zie ook het voorafgaande artikel.