

onderzocht. Het bleek 0,2 % chloride (berekend als natriumchloride, titratie met zilvernitraat) te bevatten, de pH bedroeg 6,5—7 (lyphanpapier), het water is dus zwak zuur en iets brak.

C. l. is van de verwante *confluens* te onderscheiden door de iets grotere afmeting, bovendien is de vorm meer langwerpiger, de langslijnen op de dekschilden lopen bijna tot aan de basis door, op het halsschild bevindt zich een min of meer duidelijk klein donker middenvlekje en de ♀♀ zijn fraai mat, die van *confluens* glanzend.

Hilversum, Alexanderlaan 17,

Amsterdam, Gerard Terborghstraat 23, October 1947.

Een nog niet beschreven var. van *Deronectes canaliculatus* Lac. in Nederland (Coleoptera)

door

A. RECLAIRE en P. VAN DER WIEL.

In de in onze bovenstaande mededeling over *Coelambus lautus* genoemde plas werd, toen hij nog volop *Deronectes canaliculatus* Lac. bevatte, door een onzer (R.) op 9.7.1945 hiervan een tweetal aan elkaar gelijke voorwerpen gevonden, die onmiddellijk door het doffe uiterlijk opvielen en bij nader onderzoek eigenlijk een min of meer specifiek verschillende indruk maakten. Het gelukte ons niet de exx. op naam te brengen. Prof. J. Balfour-Browne te Londen, aan wie een ex. gezonden werd, schreef ged. 19.8.'47 hieromtrent als volgt: „.....of *Deronectes* which I am unable to accept as other than a rather unusual aberration of *D. canaliculatus*, the most noticeable difference apart from the paler colour being in the sides of the pronotum just in front of the posterior angles which are more sinuate, the posterior angles, therefore, more pronounced than usual. I have not seen any specimens of this species which are so marked in this respect but I do not think that it could be accepted as more than a rather extreme variation.....”

Wij hebben hier dus met een nog niet beschreven afwijking of nieuwe soort te doen, die wij voorlopig var. *pantherina* zullen noemen vanwege de eigenaardige vlekjes op de dekschilden, die enige oppervlakkige gelijkenis vertonen met die op de dekschilden van *Elaphrus*. Van de typische vorm onderscheidt de var. zich als volgt: achterhoeken van het halsschild iets meer uitgebogen, de gewelfde tussenruimten der dekschilden minder scherp aangeduid, de dekschilden opvallend doffer dan bij de typische voorwerpen. De var. is vooral ook door de kleur onderscheiden: de fijne zwarte langslijnen en de verspreide zwarte vlekken op de dekschilden zijn minder sterk aangeduid dan bij de typische vorm, de dekschilden zijn geel, bezaaid met zeer kleine ronde grijsachtige vlekjes, die vooral op de achterhelft duidelijker en donkerder van kleur zijn.

De beide gevonden exx. zijn volkomen aan elkaar gelijk en maken de indruk tot een afzonderlijke soort te behoren.

Summary. *Deronectes canaliculatus* Lac., var. *pantherina* nov. The whole upperside of a paler colour than the type-form, the sides of the pronotum just in front of the posterior angles more sinuate, the posterior angles also more pronounced than usual; the black lines and spots on the elytra nearly missing, the elytra are pale yellow, wholly sprinkled with very small round greyish spots, near the top clearer and darker.

Two completely corresponding exx. were found near Hilversum (Holland) on 9-7-1945.

Hilversum, Alexanderlaan 17,

Amsterdam, Gerard Terborghstraat 23, October 1947.