

Z. van mijn huis. Op de daartussen liggende heidevelden bevonden zich vroeger veel waaidennen. Deze zijn echter tijdens de hongerwinter opgestookt, er zijn slechts enkele armelijke exx. overgebleven. De vele van de kap tijdens de oorlog achtergebleven stobben waren deze zomer alle geroid, zodat de tor wel uit de dichtstbijzijnde dennenbossen afkomstig moet zijn. Uit een en ander blijkt dus, dat hij een vrij grote afstand vliegend moet kunnen afleggen<sup>1)</sup> en hij moet wel een fijne speurzinn voor terpentijngneur of dgl. bezitten. Dat hij op terpentijngeuren afkomt — de stobben bevatten behalve terpentijnolie ook allerlei andere sterk riekende stoffen — is te begrijpen, gezien zijn levenswijze.

Het zou interessant zijn te weten, of ook elders iets dergelijks is opgemerkt, want het zou kunnen zijn, dat de grote hitte een rol heeft gespeeld. Tot nu toe had ik *Spondylis* zo nu en dan bij Hilversum waargenomen, ook 1 x des middags zwermend in de felle zomerzon, doch uit de aard der zaak had ik aan de kever weinig aandacht besteed.

Hilversum, Alexanderlaan 17, October 1947.

### Faunistische aantekeningen over Lepidoptera

door

C. J. VERHEY.

1. *Araschnia levana* L. Over deze vlinder vermeldt L e m p k e (1946, Natuurhistorisch Maandblad 35 : 23—24), dat hij bezig is zijn areaal in ons land uit te breiden en ook in België en Frankrijk de laatste tijd veelvuldiger voorkomt.

Als nieuwe vindplaats kan ik Vorden vermelden, waar ik op 20 Juli 1947 één exemplaar en op 23 Juli 1947 zelfs twee exemplaren op bloeiende sneeuwbes (*Symphoricarpos*) zag rondvliegen. Hoewel ik gedurende tien dagen de omgeving naar vlinders heb afgezocht, heb ik toch niet meer exx. kunnen waarnemen. Twee, beide ♂♂, bevinden zich in mijn collectie, ze behoren natuurlijk tot de vorm *prosa* L.

2. *Daphnis nerii* L. Van deze vlinder werd door een mijner leerlingen een prachtig gaaf ♂ ex. op 9 October 1947 te Zwijndrecht gevangen. Slechts de thorax was enigszins beschadigd, dit kwam doordat het ex. in een te laag blikken doosje was gedrukt.

De Catalogus (Tijdschr. v. Ent. 80 : 255) vermeldt, dat de meeste exemplaren hier te lande gevangen (vanaf 1762 slechts 19 stuks) in sterk afgevlagen toestand verkeerden. Slechts eens in Juni 1908 werd te Borne een gaaf ♂ gevangen en slechts tweemaal, n.l. in 1835 en in 1895, werden rupsen in ons land gevonden.

Of dit ex. zich hier te lande uit de rups ontwikkeld heeft, is niet geheel zeker. In de fles, waarin het dier destijds werd gedood, bevindt zich een oranje-rood meconium. Of dit daar bij het doden van dit ex. is gekomen of van een andere vlinder afkomstig is, weet ik helaas niet meer. Wel zijn enkele schubben bij de anale opening ook oranje-rood gekleurd, hoewel O u d e m a n s (1900, Nederlandsche Insecten : 391) alleen oranje-rood meconium van dagvlinders vermeldt. Zijn er waarnemingen over de kleur van het meconium der *Sphingidae*?

Het is anders best mogelijk, dat in een kwekerij of op een buitenplaats *Nerium oleander* wordt gekweekt, zodat dan de herkomst van dit ex., mede door de warme zomer, verklaarbaar zou zijn.

Het laatst, dat *Daphnis nerii* L. te Dordrecht werd gezien, was ± 1900 door wijlen de heer N. A. d e J o n c h e e r e.

Dordrecht, Van Bleyenbergsstraat 8, 6-2-1948.

<sup>1)</sup> Ook van de grote dennensnuittor is bekend, dat hij ver vliegt.