

**Weer een nieuwe Geometride.** Het jaar 1948 zal wel door de meeste lepidopterologen met een zwarte kool worden aangetekend. De vangst, op welke wijze ook beoefend, was en bleef slecht. Tot nog toe had ieder jaar hier in Twello — de oorlogsjaren natuurlijk uitgezonderd — toch wel enkele avonden gebracht, waarop meer dan honderd soorten macro's, tot 120 of 130 toe, naar de lamp kwamen vliegen. Dit jaar heeft zijn hoogtepunt evenwel reeds bereikt op 13 Juni, met 73 soorten. Onder deze bevond zich — tot mijn verrassing — een ♂ exemplaar van een voor onze fauna nieuwe soort, nl. *Scopula (Acidalia) ternata* Schrk. (*fumata* Steph.). De vlinder is tamelijk afgevlagen, mist b.v. de brede franje bijna geheel, maar is toch nog duidelijk herkenbaar. Vergelijking met een Duits ex. bevestigt de juistheid der determinatie.

H. C o l d e w e y, Twello, K. 73.

**Nomenclatuur.** Het is niet mijn bedoeling nu reeds alle veranderingen op te geven, die aangebracht moeten worden in de in de Catalogus gebruikte nomenclatuur. Ik wacht daarmee tot het Supplement. Wel zorg ik er voor, dat de artikelen en mededelingen in de Ent. Ber., voor zover het de *Macrolepidoptera* betreft, nomenclatorisch bij zijn, zoals men al bemerkt zal hebben. Voor twee gevallen wil ik echter een uitzondering maken :

1. *Spialia sertorius* Hoffmannsegg, 1804 (*sao* Hb., 1800—1803, nec Bergstr., 1779). In Ent. Ber. 11 : 160 (1944) wijzigde ik de soortnaam in *hibiscae* Hb., in navolging van H e m m i n g. E v a n s (1947, Entom. 80 : 167) wijst er echter op, dat het anonieme werkje van Hübner „Der Schmetterlinge Lepidoptera Linnei” als niet gepubliceerd beschouwd moet worden. H e m m i n g heeft dat tot nog niet tegengesproken. De correcte naam wordt dus als in de aanhef van deze noot aangegeven.

2. *Donsvlinder* en *Basterdsatijnvlinder*. Bij het begin van de oorlog werd de coll. van L i n n a e u s uit Londen geëvacueerd. Te voren werden echter alle typen gefotografeerd door T a m s. Daarbij was ook dat van *Phalaena B. Chrysorrhoea*. Dit is, niettegenstaande het „abdomine apice barbato luteo” van de beschrijving van 1758 (Syst. Nat., ed. X : 502) een ♀ van de *Basterdsatijnvlinder*! Zie C o l l e n e t t e, C.L., The identity of *Phalaena Chrysorrhoea* Linnaeus, 1758, 1947, Bull. Ent. Research 38 : 259—261. Bovendien zijn volgens deze specialist beide soorten co-generiek, zodat de nomenclatuur nu wordt : *Donsvlinder*, *Euproctis similis* Fuessly ; *Basterdsatijnvlinder*, *Euproctis chrysorrhoea* Linnaeus. — Lpk.

**Orthoptera.** De Veldbiologen maak ik opmerkzaam op C l a r k, E. J., Studies in the Ecology of British Grasshoppers, Trans. R. ent. Soc. London 99 : 173—222 (1948). Het wil mij voorkomen, dat ook voor ons Nederlanders dit een zeer belangrijke publicatie is.

De Bibliothecaris.

**Chrysididae.** Specialisten in deze groep *Hymenoptera* worden er van in kennis gesteld, dat Dr. med. Stephan Z i m m e r m a n n *Chrysididae* der gehele wereld determineert, ruilt en koopt. Adres : Wien, VIII., Josefstädterstrasse 21, Österreich. Zendingen van Musea aan : Naturhistorisches Museum (Zoolog. Abt.), Wien I., Burgring 7.