

deze vorm een ab ovo kweek te proberen, afgezien van mijn eigen mislukte poging. 21 Juli ving ik te Ouddorp langs de duinrand een prachtig verse *helice* in copula met een vrij sterk afgevlogen ♂. Het lukte me het paar in een doosje en later in een glas te krijgen, zodat de copulatie ongestoord voort kon gaan. Toch legde het ♀ later slechts enkele onbevuchte eieren.

Bijzondere opmerkingen. Van half Juli tot half Aug. in Zuid-Limburg geregeld, maar niet veel (Van Wisselingh), bij Vaals in September veel (Delnoye). Bij Steyl heeft *croceus* zeer druk gevlogen, half October toename in zeer mooie, iets kleinere exx. (Br. Antonius). Bij Vlissingen van begin Aug. tot begin Nov. talrijk (Henrard). Bij Hilversum van 8-IX tot 12-X plaatselijk talrijk in verse exx. (Caron). Babberich: niet algemeen (Elfrink). Twente: veel minder dan *hyale* (Knoop). Omgeving van Leeuwarden: 11 *croceus* tegen 70 *hyale*! (Camping).

Trek. 25 Sept. vlogen te Westzaan 17 exx. steeds in de richting N.—Z. (Westerneng). 5 Octr. zag Herwarth te Heemstede een trek in Z.O. richting vanaf 10 uur en telde \pm 50 exx. 12 Octr. herhaalde zich het verschijnsel in dezelfde richting. Op deze zelfde datum zag Kets te Hoog Keppel op een klaverveld een flink aantal onstuimig vliegende exx. Hij kreeg de indruk, dat, wanneer de dieren zich gevoed hadden, ze steeds in Z. richting wegvlogen.

Totaal aantal waarnemingen: 3987, dus slechts $\frac{2}{3}$ van dat van *hyale* (overigens geldt dezelfde opmerking als bij deze soort).

(Wordt vervolgd).

Korte mededelingen.

Nieuwe Syrphidae voor de Nederlandse Fauna. De beide volgende soorten kunnen aan de lijst van Nederlandse *Diptera* worden toegevoegd:

Chilosia chloris Mg. Van deze soort werd door mij een ♂ gevangen tijdens het inventarisatiewerk aan de Beerze bij Balsvoort in de omgeving van Boxtel op 1-6-1946.

Sphaerophoria loewii Zett. Van de vier in het omliggende gebied voorkomende *Sphaerophoria*-soorten was dit de enige, welke totnogtoe niet in Nederland was gevonden. Het is ook de zeldzaamste. Lundbeck vermeldt slechts vier oude vondsten in Denemarken. Het dier schijnt volgens opgaven van Lundbeck en van Sack een voorkeur te hebben voor vochtige terreinen. Hierdoor wordt het waarschijnlijk zo zelden aangetroffen, aangezien in dergelijke terreinen over het algemeen heel weinig verzameld wordt. Op 13-6-1946 werd door mij in Ankeveen bij het Vechtplassen-onderzoek een ♀ van deze soort gevangen. Deze vindplaats is dus wel in overeenstemming met het opgegeven biotoop voor Denemarken en Duitsland.

D. Piet, Zoöl. Museum, Amsterdam-O.

Afd. Noord-Holland en Utrecht. Dit winterseizoen zal de Afdeling nog 2 vergaderingen houden en wel op 15 December en 16 Maart, telkens te kwart voor 8 in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. Ook niet-leden van de Afd. zijn zeer welkom.

P. van der Wiel, Secretaris.