

50. *Torilis japonica* DC. De bladslippen zijn gedraaid, en de bladeren tot proppen in elkaar gegroeid. De schermen zijn tot kluwens van onontwikkelde en vaak vergroende bloemen ontwikkeld. Denekamp, VII, 1946, H. Alta en A. R. Schouten coll.

Bls-Aphide.

51. *Ulmus* species. Op de hoofdnerf aan de bovenkant van het blad is een platte gal bevestigd. Deze gal kan 6—10 mm hoog en breed zijn en 1—1½ mm dik. De oppervlakte is rood of geelachtig met rood. De bovenrand is kamvormig getand. Bij het rijp worden ontstaat een opening in de smalle zijkant. Houthem, Z.L., VI, 1946, D. Hille Ris Lambers coll.

Bls-*Colopha compressa* Koch.

52. *Veronica longifolia* L. De bloeiwijzen zijn samenge-drongen door verkorting van de assen, de bloemen openen zich niet of slecht, de gehele bloeiwijze is vaak gekromd. Denekamp, VI, 1946, H. Alta coll.

Bls-Aphide.

LITERATUUR.

- Barkman, J. J., 1944, Over enige vondsten van Nematoden gallen op bladmossen. *Levende Natuur*, 48 : 137.
- Boudier, E., 1893, Sur les causes de production de tubercules pileux des lames de certains Agaricaceae. *Rev. gén. d. Bot.* 5 : 29.
- Brouwer, M. T., 1946, Een aantasting door een mijt, vermoedelijk *Phyllocoptes fockeui* Nal. bij perziken en pruimen. *Tijdschr. v. Plantenziekt.* 32 : 163.
- Docters van Leeuwen, W. M., 1946, Gallenboek. Nederl. zoöceciënen, door dieren gevormde gallen. (tezamen met H. Alta). Amsterdam.
- , 1947, Zoöceciënen van het eiland Ameland. *Ent. Ber.* 12 : 181.
- , 1947, (1945), The bisexual generation of *Diplolepis disticha* Htg., *Tijdschr. v. Ent.* 88 : 271.
- , 1948, Zoöceciënen van het eiland Schiermonnikoog, *Ent. Ber.* 13 : 217.
- Hille Ris Lambers, D., 1945, De bloedvlekkenluis van appel, *Sappaphis devecta* (Wlk.), *Tijdschr. v. Plantenziekt.* 51 : 57.
- Klinkenberg, J. Ch., 1947, Aaltjesziekte in aardbeien, *Tijdschr. v. Plantenziekt.* 53 : 110.
- Meijere, J. Ch. de, 1947 (1945), Over eenige Dipterenlarven, waaronder een galmug, die mijngangen maakt, en twee Dipteren, die gallen op paddestoelen veroorzaken. *Tijdschr. v. Ent.* 88 : 49.
- Pol, P. H. van de, 1946, *Bembecia hilaeiformis* Lasp., een weinig voorkomende beschadiger van de framboos, *Tijdschr. v. Plantenziekt.* 52 : 25.
- Ross, H. und Hedicke, H., 1927, Pflanzengallen Mittel- und Nordeuropas. Zweite Auflage, Jena.
- Ruebsaamen, E. H., 1899, Mitteilungen ueber neue und bekannte Gallen aus Europa, etc., *Entom. Nachricht.* 25 : 234.
- Leersum, Maart 1948.

***Ptinus tectus* Boieldieu als parasiet bij mensen.** Op de 79e Wintervergadering der N. E. V. deed de heer G. L. van Eynhoven namens Dr D. Mac Gillavry een mededeling over darmparasitisme van larven van *Pt. tectus* (1948, *Tijdschr. voor Ent.* 90 : III). In *Ent. Rec.* 60 : 119 (Dec. 1948) bespreekt H. Donisthorpe deze mededeling en noemt de in Engeland waargenomen gevallen „buitengewoon twijfelachtig”. De kever breidt zijn territorium in Engeland snel uit. — Lpk.