

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

No. 289.

Deel XII.

1 Mei 1949.

Adres der Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12^{III}, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD: P. Benno: Aantekeningen over Bijen en Wespen III (p. 361). — † L. H. Scholten: Bijdrage tot de kennis van *Araschnia levana* L. en zijn verbreiding in ons land (p. 362). — H. J. de Fluiter: Een belangrijke publicatie over de Nonvlinder (p. 364). — W. Roepke: Nomenclatorische aantekeningen I (p. 372). — L. van der Hammen: Over levend naar Nederland getransporteerde exotische spinnen (p. 374). — C. O. van Regteren Altena: Is *Melitaea didyma* (Esper, 1779) in Nederland gevangen? (p. 374). — Boekbespreking (p. 375). — Korte mededelingen (p. 373, 376).

Aantekeningen over Bijen en Wespen III

Twee zeldzame *Odynerus*-soorten uit de Deurnese Peel (Hym., Vesp.)

door

P. BENNO.


Aansluitend aan onze vorige bijdrage tot de faunistiek van het Peelgebied en aan hetgeen wij schreven over het voorkomen van *Odynerus delphinalis* Gir. in dit gebied ⁽¹⁾, kunnen wij nog twee soorten van het geslacht *Odynerus* Latr. vermelden, welke o.i. nieuw zijn voor de Nederlandse fauna, nl.:

1. *Odynerus* (*Lionotus*) *Dantici* (Rossi) F.n. sp. — Deurne, 27-VII-1948 (♀), op *Achillea millefolium* L. Deze soort werd ook reeds voor België als f.n.sp. opgegeven door Crèvecoeur & Maréchal (1935), uit de omgeving van Visé. Zij behoort tot de groep *Euodynerus* Blüthgen (door hem als zelfstandig genus behandeld) en is o.a. door de vorm van het postscutellum, clypeus en de rijke gele tekening gemakkelijk te herkennen van de andere *Lionotus*-soorten. De enige voor ons land in aanmerking komende soort van deze *Euodynerus*-groep is *O. quadrifasciatus* F., die reeds door Ritsema Cz. (1875) voor ons land werd opgegeven. Hoewel *O. Dantici* in Midden-Europa een gewone soort is, moet zij voor ons land stellig zeldzaam genoemd worden.

2. *O.* (*Microdynerus*) *exilis* H.-Sch. F.n. sp. — Helenaveen, 11-VI-1948 (♀), op *Aegopodium*. Een *Microdynerus*-♂, dat ik reeds vroeger ving te Beers (N.Br.) op een oude eikepaal (18-VI-1945), lijkt mij eveneens tot deze soort te behoren. Merkwaardig is het, dat ik op dezelfde paal ook beide sexen ving van *Chrysis gracillima* Först. Deze Goudwesp is tot nu toe enkel als parasiet bekend van *Microdynerus* of althans van nauwverwante soorten, nl. *O.* (*Microdynerus*) *nugdunensis* Sauss. (Friese) en *O.* (*Pseudomicrodynerus*) *helvetius* Sauss. (Enslin, 1929). Zij is op een 5-tal plaatsen in ons land gevangen, hoofdzakelijk in het Zuid-Oosten. Naar het schijnt komt ook *O. nugdunensis* in Nederland voor, maar officieuze opgaven hiervan heb ik niet kunnen vinden. Beide soorten zijn in elk geval voor ons gebied wel als zeldzaam te beschouwen.

Capucijnenklooster „Biezemortel”, Udenhout, November 1948.

¹⁾ Tijdschr. voor Ent. 88: 400.



MAY 18 1949