

5. Hoe moeten onze *Saturnia*'s heten? Linnaeus, 1758 : 496—497 spreekt alleen van „*Phalaena Bombyx pavonia*”, en verdeelt deze in *Ph. B. pavonia minor* en *Ph. B. pavonia major*, hiermede onmiskenbaar bedoelende de z.g. kleine en grote nachtpauwoog, thans algemeen geheten *Saturnia pavonia* L. en *pyri* Schiff. De soort *S. spini* Schiff. kende hij nog niet. In zijn *Fauna Svecica*, 1761 : 291, noemt hij alleen *Ph. B. pavonia*, zonder toevoeging van de aanduiding *minor*. Het zou wenselijk zijn, dat door Congres-besluit de namen *pavonia* en *pyri* worden gewettigd. Verder moge er op het volgende worden gewezen. L. heeft waarschijnlijk de Zuidzweedse vorm van *pavonia* beschreven. Mocht de Middeneuropese hiervan subspecifiek verschillen, dan dient deze *S. pavonia carpini* Schiff. te heten. Voorts heeft Jordan in *Seitz* 2 : 222 (1911) de soorten *S. spini* en *pavonia* in een nieuw genus *Eudia* geplaatst, met uitdrukkelijke fixering van *pavonia* als typus generis. De naam *Saturnia* is van Schrank, *Fauna Boica* 2 : 149 (1802), afkomstig. Deze auteur citeert als soorten van dit geslacht : *pyri*, *spini*, *carpini* en *tau* ; Kirby, 1840, p. 89, kiest hieruit „*minor* L.” (= *carpini* Schiff. = *pavonia* auct.) als typus generis, en deze fixatie is, zover ik weet, geldig. De naam *Eudia* Jord. 1911 vervalt hiermede als synonym van *Saturnia* Schrk. 1802.
6. Hoe moeten de graan- en rijstklenders heten? Deze insecten staan van ouds te boek onder de naam *Calandra* F. 1801, *Syst. Eleuth.* 2 : 429. Volgens Neave : *Nomencl. Zool.* 1 : 522 (1939), is dit een verbetering van *Calendra* Schellenb., *Helvet. Entom.* 1 : 62 (1798). Wanneer *Calendra* werkelijk een drukfout is, dan heeft Fabricius het recht, de schrijfwijze in *Calandra* te wijzigen. Nu is de naam *Calandra* echter door Zimmerman, 1793, p. 286, voor vogels gebezigd, volgens Neave evenwel als „nomen nudum”, en dus, zou ik zeggen, ongeldig. Ook andere ornithologen hebben deze naam overgenomen, eveneens steeds als „nomen nudum”. In 1838 plaatst Schönherr de bewuste kevers in zijn genus *Sitophilus*, en sedertdien wisselen de namen *Calandra* en *Sitophilus* in de literatuur om beurten af. Zou het niet aanbeveling verdienen een Congres-besluit ten gunste van *Calandra* uit te lokken?

Wageningen, Lab. voor Entomologie, Febr. 1949.

Veenmollen op Walcheren ten Oosten van het kanaal door Walcheren. De vader van de heer P. J. Brakman vertelde hem na lezing van het artikel over de insecten-plagen op Walcheren in 1948 (cf. *Ent. Ber.* 12 (287) : 341—342, 1 Maart 1949) : „De veenmol kwam hier vroeger toch wel voor op lichte gronden (die er niet teveel zijn). In de zware kleipolders (het grootste deel der gemeente Nieuw- en St. Joosland) had ook hij nooit van veenmollen gehoord. Na het leggen van de Sloedam kwamen de mollen hier en verdwenen practisch alle veenmollen.”

Deze correctie op het artikel geeft nog meer grond aan de veronderstelling, dat de toenemende verspreiding der mollen op Wacheren zelf de veenmollenplag daar wel spoedig tot bescheiden verhouding zal terugbrengen.

D. Mac Gillavry, Rusthuis „Charlois”, Amerongen.