

verzameld moeten worden, of wat nog beter zal zijn: entomologisch bezoek ook buiten het gewone seizoen. Zoo zal dunkt mij *Grapholitha lamda* F. ssp. *zinckenii* Tr. een goede kans hebben. *Nonagria*'s zullen toch zeker wel op de eilanden te vinden zijn.

D. MAC GILLAVRY.

Het ei van *Drepanopteryx phalaenoides* L.

In de Entom. Ber. N. 189 Dl. VIII, 1 Jan. 1933 p. 447 maakte ik melding van het feit, dat van de levenscyclus van *Drepanopteryx phalaenoides* L. het ei nog onbekend was. Onlangs werd door L. Fulmek in de „Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie“ Bd. 8 Nr. 2, 15 Juli 1941 p. 127—130 het ei beschreven en afgebeeld. De geheele ontwikkeling uit het ei tot de volwassen larve wordt eveneens in dit artikel behandeld. Tot de aangehaalde lectuur behoort Killington, F. J., A Monograph of the British Neuroptera, II. 1937.

Bergen, N.H., „De Haaf“.

D. MAC GILLAVRY.

Verdrinkende Vlinders.

Het viel mij dikwijls op, dat in de slooten van mijn terrein, wanneer ze met kroos bedekt waren, in dat kroos mooie meanders en figuren voorkwamen. Die open lijnen waren ongelijk, maar soms vier en meer cm breed. Wie had die lijnen getrokken? Ze geleken zoo op de lijnen, die men vaak in het oppervlaktevuil der Amsterdamsche grachten kon zien, dat aanvankelijk aan de mogelijkheid van ratten gedacht werd als veroorzakers. Bij nadere beschouwing bleek echter veelal aan een der uiteinden een verdronken vlinder of een vlinderrestant te zitten. Ook kwam het voor, dat de vlinder nog leefde en door spartelen de voor verder trok.

Een zeer mooie lijn, van wel 8 à 10 m lengte en ruim 4 cm breed, bleek aan het uiteinde een *Brotolomia meticulosa* L. te bevatten. Toen ik mijn huisgenooten ging waarschuwen om de interessante figuur te komen bewonderen en om te trachten er een foto van te laten maken, had, bij terugkomst, de vlinder, na nog een paar meters gezwommen te hebben, de vaste wal bereikt en was zodoende in veilige haven gekomen. Fotografieren zou trouwens moeilijk geweest zijn, daar de sloot aan weerszij overschaduwde is en geheel het karakter van een boschsloot heeft.

Het aantal ook in 't open water te vinden vlinders is overigens vrij belangrijk; het betreft meest spanners, micro's en wat uilen. Vooral in voor- en najaar is dit het geval.