

Een melanistisch exemplaar van *Rhagonycha fulva* Scop. (Col., Canthar.)

Van de algemeen bij ons voorkomende Cantharide *Rhagonycha fulva* Scop. werd door Snellen van Vollenhoven in 1848 in zijn Naamlijst van Schildvleugelige Insecten (onder *Cantharis melanura* L.) een ♂ exemplaar vermeld, met geheel zwarte dekschilden, dat door hem te Velzen in copulatie gevangen werd. Everts trekt klaarblijkelijk deze vondst in twijfel. Hij maakt namelijk in zijn Col. Neerl. III, 1922, p. 350 de opmerking, dat de opgave van Snellen van Vollenhoven wel op een verkeerde determinatie zal berusten.

Dat dit laatste geenszins het geval behoeft geweest te zijn moge blijken uit het feit, dat ik op 25 Juli 1940 het geluk had, om tusschen een groot aantal typische exemplaren der soort, dat zich omstreeks dien tijd in mijn tuin te Oegstgeest en in de naaste omgeving vertoonde, een ♂ exemplaar aan te treffen, eveneens in copulatie, dat ook in het bezit was van zwarte dekschilden.

Nu zijn van *R. fulva* eenige kleuraberraties bekend, waarbij het zwart van het uiteinde der dekschilden zich naar voren toe uitbreidt. Dit is het geval bij de var. *usta* Gemm. en in meerdere mate nog bij de var. *Delahoni* Schilsky. Vrijwel geheel zwart zijn zij bij de var. *Cailloli* Chobaut, welke beschreven werd door Chobaut in zijn Catalogue des Coléoptères de Provence de Caillol, 3, 1914, p. 31. M. P. Lesne van het Muséum National d'Histoire Naturelle te Parijs was zoo vriendelijk mij op mijn verzoek de beschrijving van deze var. te doen toekomen. Daar het artikel van Chobaut hoogstwaarschijnlijk niet in Nederland aanwezig is, laat ik de oorspronkelijke beschrijving hier volgen:

„Cette variété diffère du type: par le pronotum tacheté de noir surtout au niveau des bosses prothoraciques; par les élytres entièrement noirs avec le base et les côtés vaguement rougeâtres; par les pattes noires tachetées de rougeâtre et par le dessous du thorax noirâtre. C'est donc, pour moi, une forme mélanique de l'espèce. J'ai capturé cette curieuse *Rhagonycha* le 3 mai 1892, à Villeneuve-lès-Avignon. Un seul exemplaire”.

Bij het exemplaar uit Oegstgeest is het halsschild roodbruin, donkerder dan bij typische exemplaren, met zwartachtige randen; de dekschilden zijn alleen aan de zijden bij de basis iets roodbruin, aan de basis zelf zijn zij zwart; de pooten zijn zwart, met de dijen iets doorschijnend bruinachtig. Verder is de kop vóór de inplanting der sprieten en ertusschen rood, meer naar achteren echter zwart; de sprieten zijn geheel zwart, dus ook de sprietbasis, die bij typische exemplaren rood is. Ook zijn aan het achterlijf de sternieten in het midden zwartachtig.

Hoewel er dus eenige kleine verschillen zijn met Chobaut's beschrijving, zijn die zoo gering, dat het zeker niet verantwoord is mijn vondst als een afzonderlijke aberratie te beschrijven. Ik aarzel dan ook niet het exemplaar tot de var. *Cailloli* te rekenen.

Oegstgeest, November 1942.

S. J. VAN OOSTSTROOM.

Drie voor de Ned. Fauna nieuwe Coleoptera uit Zeeland, benevens één uit Z. Limburg.

Brachygluta (*Reichenbachia*) *Waterhousei* Rye.

Aan het Sloe, vrij op het slik rondlopend. Nieuw en St. Joosland VI-1940, 1 ♂; op dezelfde plaats VII-1942, 1 ♂. Deze soort leeft volgens Everts langs de zee-kusten van Engeland en N. Frankrijk, volgens den Winkler Katalogus ook in het Middellandsche Zeegebied. Het gelukte me nog niet de soort door uitzeven van aangespoelde wieren enz. te bemachtigen. Op deze wijze verkreeg ik op dezelfde plaats wel *B. Helferi* Schmidt in klein aantal. *Waterhousei* zou verward kunnen worden met *haemoptera* Aubé, de dekschilden zijn evenwel langer en de langsstreepjes op het eerste tergiet zijn op meer dan $\frac{1}{3}$ van de breedte van het tergiet van elkaar verwijderd. Bovendien vertoont het ♂ van *haemoptera* andere kenmerken en komt deze soort voor zoover bekend niet aan de zee kust voor.

Cercyon subsulcatus Rey.

Horion (Nachtrag z. Fauna Germ. p. 229) vermoedt dat *subsulcatus* een slecht begrensde variëteit is van *convexiusculus* Steph. In den Winkler Katalogus wordt *subsulcatus* evenwel als afzonderlijke soort opgenomen. In Juni 1940 aan het noordelijk