

Meikevers in Nunspeet

door

D. MAC GILLAVRY.

In 1943 was 14 Mei een record warme dag. Bij het spitten bleken de meikevers al dicht aan de oppervlakte te zitten; 15 Mei afkoeling; 16 Mei waren er eenige imagines uitgevlogen, echter zeer weinig. Daarbij bleef het in Nunspeet. 1 Juli van datzelfde jaar een enkel exemplaar in Hilversum, verder zag ik in 1943 geen meikever meer.

In 1944 viel de record-warmte op 13 Mei. 's Avonds nevel en 14 Mei den geheelen dag koude regen uit het Noorden. 14 Mei een enkele ♀ meikever, alles de gewone *Melolontha melolontha* L. (*vulgaris* F.). Het eerstvolgend exemplaar bij voortdurend ongunstig weer, was een op 7 Juni overreden ♂ exemplaar met rood borststuk.

Daarna nog een gewoon ♂ 15 Juni en eind Juni '44 meerdere ♀♀.

Volgens de dorpsjeugd waren in 1942 wel iets meer meikevers door hen gezien. Toch kan in geen dezer jaren van een echt meikeverjaar gesproken worden.

Nunspeet, Juli 1944.

1944 werd een wespenjaar

door

D. MAC GILLAVRY.

Mijn onderstelling, dat 1944 een wespenjaar zou worden (zie E. B. 259, dl. XI, 21 Juni 1944, p. 207), leek aanvankelijk niet bewaarheid te worden, tot met 1 Aug. de zomerwarmte aanbrak. De geheele maand Augustus waren de wespen niet van de lucht. Ook de toch reeds zoo talrijke vliegen werden dit jaar tot een plaag.

Benieuwd of onze Hymenopterologen en Dipterologen ons nog iets over de verschillende soorten zullen mededeelen. De nieuwe determineerlijst door Kruseman kan mooi helpen om tot betrouwbare determinatie der wespen te geraken (E. B. 260 dl. XI, 21 Juli 1944, p. 204—212). 11 October zag ik alweder de eerste koninginnen binnenshuis komen ter overwintering, de laatste 5 Nov.

Nunspeet, Nov. 1944.

Cicindela

door

D. MAC GILLAVRY.

In 1943 was *Cicindela hybrida* L. in Nunspeet wel op de zandplekken in de heide aanwezig, maar volstrekt niet talrijk. *C. campestris* L. zag ik pas veel later en slechts enkele exemplaren. Wel een tegenstelling met vroeger, waar ik beide soorten veelvuldig tot zelfs op de paden van mijn toenmaligen tuin vond. Collega Wilcke vond in 1943 in Bennekom beide soorten even overvloedig als altijd, wel *campestris* overwegend.

Dit jaar 1944 viel hem op, dat in Bennekom juist *C. hybrida* veel talrijker was dan *campestris*. Hier op de Noord Veluwe was het dit voorjaar met het ongunstige weer haast niet mogelijk een *Cicindela* te vinden. Pas half Juli werden ze iets talrijker.

Nunspeet, Sept. 1944.

Een inheemsch exemplaar van *Argynnis niobe* (L.) ab. *pelopia* (Bkh.)

door

C. O. VAN REGTEREN ALTENA.

Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden kreeg van den heer P. J. den Boer te 's-Gravenhage een fraai melanistisch ♂ van *Argynnis niobe* (L.) ten geschenke, dat door hem op 27 Juni 1943 bij de sprank van de waterleiding in den Kijfhoek bij Duinrel (gem. Wassenaar) was gevangen. Dit exemplaar wijkt sterk af van den typischen vorm, zoodat het op het eerste gezicht nauwelijks als tot *A. niobe*