

# ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERL. ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

No. 207.

DEEL IX.

1 Januari 1936.

*Adres der Redactie :*

H. COLDEWEY, „Nieuw-Veldwijk”, K 73, TWELLO.

INHOUD : F. C. J. Fischer : Aanteekeningen over enkele Nederlandsche Trichoptera. — C. Willemse : Remarks on some Indo-Malayan Acrididae, with description of new species. II (with 3 figures). — Dr. D. Mac Gillavry : Les Bulletins de la Société entomologique de France (Bibliographische bijdrage. VII.). — H. Coldewey : Merkwaardige overeenstemming. — Dr. D. Mac Gillavry : Boekbespreking. — G. S. A. v. d. Meulen : Mededeeling. — Adreswijziging.

De Bibliotheek der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, Koloniaal Instituut, Mauritskade 62, Amsterdam (O.), is geopend op werkdagen van 9½—12 uur en van 1—4½ uur, des Zaterdag slechts van 9½—12 uur. Aanvragen om boeken richt men aan de Bibliotheek, Mauritskade, en niet aan den Bibliothecaris; voor terugzending geldt hetzelfde.

Inzenders gelieven het door hen gewenschte aantal extra-exemplaren der E. B. (iedere hoeveelheid) of overdrukken (minstens 50 stuks) tegelijk met de inzending van hun manuscript aan te vragen.

## Aanteekeningen over enkele Nederlandsche Trichoptera.

I. Blijkens de resultaten der onderzoekingen van K. H. Forsslund, neergelegd in zijn „Revision der Zetterstedtschen Trichopteren aus Lappland”<sup>1)</sup>, is het noodzakelijk de namen van enkele in mijn „Verzeichnis der in den Niederlanden und dem Nachbargebiete vorkommenden Trichoptera”<sup>2)</sup> opgenomen Trichoptera te wijzigen.

De effen goudgeel gekleurde variëteit van *Holocentropus picicornis* Steph. (No. 25), bekend als var. *auratus* Kol., moet var. *aureola* Zett. heeten, terwijl de tot nu toe als *aureola* Zett. bekende *Tinodes* (niet inlandsch) in *T. pusilla* McLäch.

<sup>1)</sup> Entomol. Tidskr. Årg. 50, Häfte 3—4, pp. 185—195. 1929.

<sup>2)</sup> Tijdschr. v. Entom. LXXVII, pp. 177—201. 1934.





omgedoopt werd. *Molanna palpata* McLach. (No. 82) moet gewijzigd worden in *M. albicans* Zett. De naam van *Molannodes zelleri* McLach. (No. 83) werd in *M. tincta* Zett. veranderd (ook *steini* McLach. is een synoniem van deze soort).

Ten slotte heeft Forsslund den naam *Anabolia laevis* Zett. laten vervallen, daar Zetterstedt hieronder twee verschillende soorten begreep. De als *laevis* bekende soort (niet inlandsch) heet nu *A. furcata* Brau.

II. Met het doorzien der collectie-Albarda ben ik thans gereed gekomen. Voor zoover de resultaten hiervan nog niet in het reeds genoemde „Verzeichnis” opgenomen konden worden, volgen deze hieronder. Tevens worden nog enkele mij intusschen bekend geworden nieuwe vindplaatsen vermeld.

20. *Plectrocnemia conspersa* Curt. : Twello (Cold.)!

31. *Ecnomus tenellus* Ramb. : Zutfen (F.)!

32. *Tinodes waeneri* L. : Venlo (F.)! Arnhem (F.)!

45. *Neuronia clathrata* Kol. : Rhenen (J. K.)!

63. *Homilia leucophaea* Ramb. : Deze soort is alleen door Albarda vermeld als gevangen te Limmel door Maurissen. Er bevinden zich echter geen exemplaren van Limmel in de collectie-Albarda, terwijl ik ze ook niet in de collectie van het museum te Brussel, waarin de collectie-Maurissen opgenomen is, heb gevonden. Hoewel er dus geen inlandsche exemplaren meer schijnen te bestaan, lijkt het mij niet noodig deze soort van de lijst der inlandsche Trichoptera te schrappen, daar de stukken indertijd zeker wel goed gedetermineerd zullen zijn. *H. leucophaea* is namelijk nauwelijks met een andere soort te verwarren en bovendien bevinden zich goed gedetermineerde buitenlandsche exemplaren in de collectie-Albarda.

82. *Molanna albicans* Zett. = *palpata* McLach. : Van deze soort heb ik nu ook inlandsche imagines gezien : Esmeer bij Veenhuizen (Beyerinck)!

89. *Limnophilus subcentralis* Brau. : De door V. d. Weele in den Achterhoek gevangen exemplaren, die zich te Leiden bevinden, heb ik thans ook gezien. Ik vermeld dit speciaal, omdat er mij verder nog slechts één inlandsch exemplaar in Nederland bekend is, nl. het door den heer Koornneef te Winterswijk gevangen stuk, dat hij zoo vriendelijk was aan mij af te staan. Het door Albarda vermelde exemplaar van Oirschot (Maurissen)! berust in het museum te Brussel.

98. *Limnophilus politus* McLach. : Almelo (F.)!

107. „ *extricatus* McLach. : Venray (F.)!

116. *Stenophylax rotundipennis* Brau. : In de collectie-Albarda bevinden zich geen exemplaren uit Apeldoorn, wel een uit Arnhem (V. M. d. R.)!

134. *Goera pilosa* Fbr. : Ginneken (H. A.)!

136. *Silo pallipes* Fbr. : Noch in de collectie-Albarda, noch in die van Maurissen te Brussel bevinden zich inlandsche



exemplaren. Wel stond onder *pallipes* in de collectie-Albarda het door hem vermelde ex. van Beek Gld. (V. Voll.). Het schijnt hier echter per abuis terechtgekomen te zijn, daar het als *piceus* Brau. gedetermineerd was. Het behoort echter evenmin tot deze soort, maar is een *S. nigricornis* Pict. De soort is dus thans alleen bekend van Kingbeek Lbg., waar larven gevonden werden door Mej. De Vos („selten”). Een vangst van de imago is ter staving van de indigeniteit dezer soort, waarvan de larve zoo gemakkelijk met haar verwanten verward kan worden, zeer wenschelijk.

138. *Silo nigricornis* Pict. : Beek Gld. (V. Voll.) !

145. *Sericostoma personatum* Spence : In de collectie-Albarda niet vertegenwoordigd door inlandsche stukken. Er stonden onder het etiket voor deze soort wel 2 exemplaren van *S. pedemontanum* McLach. uit Oosterbeek (V. M. d. R.). Dit zijn echter niet de door Albarda in zijn „Catalogue” onder *personatum* vermelde exx., daar hij bij de vindplaats Oosterbeek als vinder Backer noemt. Ik heb geen gelegenheid gehad alle stukken, die ik vroeger gezien heb, opnieuw te onderzoeken ; uit mijn eigen collectie blijkt echter, dat de soort in Zuid-Limburg beslist voorkomt. De overige vindplaatsen lijken mij thans zeer twijfelachtig. Ik vermoed, dat deze wel alle betrekking zullen hebben op *pedemontanum* McLach.

F. C. J. FISCHER.

## Remarks on some Indo-Malayan Acrididae, with description of new species. II.

(with 3 figures)

### *Althaemenes borneensis* nov. sp.

♂ : General coloration yellow and black, all tubercles black. Antennae black, with a quadrangular black spot at the insertion of the antennae. Head yellow, with a black tubercle near the inner margin of the eye and one in the middle of the cheek. Vertex yellow with a very small black tubercle on each side in the middle ; behind each eye with a black post-ocular band, not continuing on the lateral lobes of the pronotum. Eyes from above and in front bordered with black.

Mouthparts black. Pronotum slightly constricted in the metazona, strongly tectiform, median keel forming a crest, in the prozona, viewed in profile, irregular but shallowly incised ; in the metazona lowered and declive with a row of about four small, irregular teeth ; anterior margin of the lateral lobes with a row of 3—4 tubercles, mesozona on the disc with 2 tubercles and one in the lateral lobe on each