

Apion semivittatum a. *separandum* Aubé (C.N. 622 ; N.N. 3463 ; W. 519 F, spec. prop.). Schin op Geul 13.9.30, 1 tot deze ab. behoorend of deze benaderend ex. met een groot aantal van den nominaatvorm van *Mercurialis annua* geslept (Wi.).

Beharing bij dit ex. grover en iets dichter dan bij den nominaatvorm, vooral op voorhoofd, halsschild en basis der dekschilden.

Scolytus mali Bechst. a. *nitidulus* Chap. (C.N. 637 ; N.N. 3541 ; W. 8277 c. F). Epen 11.6.1934, verscheiden exx. te zamen met den nominaatvorm (Wi.).

Evenals de a. *castaneus* Ratz. behoort deze ab. wel als immatuur te worden beschouwd.

S. m. a. *strigilatus* Reitt. (C.N. 637 ; N.N. 3541 ; W. 8277 d. F). Epen 11.6.1934, verscheiden exx. te zamen met den nominaatvorm ; St.-Geertruide (Z.L.) 12.6.1934 (Wi.) met overgangen tot den nominaatvorm.

Dendroctonus micans Kugel. (C.N. 639 ; N.N. 3552 bis ; W. 8340 F). Putten (Vel.) begin Aug. 1935, in aantal onder den bast van *Picea orientalis*, enkele boomen waren reeds door deze soort gedood (Dr. Th. C. Oudemans) ; 14.8.1935 door verscheiden entomologen aldaar in groot aantal verzameld, ook eieren, larven en onuitgekleurde exx. waargenomen.

Hilversum en Amsterdam, December 1935.

A. RECLAIRE en P. VAN DER WIEL.

Merkwaardige overeenstemming. ¹⁾

In de Ent. Berichten, no. 207, van 1 Januari 1936, deelt de heer H. Coldewey iets mee over massavangst op smeer te Haamstede en in verband daarmee vermeldt hij een mededeling over hetzelfde onderwerp van P. Siviter Smith uit Midden-Engeland.

Dat artikeltje riep onmiddellijk herinneringen in mij wakker. Ik zocht in m'n notitieboekje en vond daarin enkele gegevens, die een interessante aanvulling geven op Coldewey's artikel.

Ik vond genoteerd :

Vrijdag 21 Juni 1935 : Gesmeerd in de Bijvank. Mistig, maar toch tamelijk goed.

Woensdag 26 Juni 1935 : Mislukte smeeravond. Toen ik tegen 10 uur met smeren bezig was, dreigde zwaar onweer uit het zuiden. Ik haastte me daarom naar huis en was net op tijd binnen, ook ter wille van m'n vrouw ! Ik vond het zeer jammer, dat ik moest vluchten, want het leek me ideaal „smeerweer”.

¹⁾ In spelling-1934. Red.

Donderdag 27 Juni 1935 : Terug naar de Bijvank. Ik had de vorige avond de pot met stroop in der haast in een schuur van den heer Meisters geborgen. Het smeersel was wel erg dun geworden, het dreef onmiddellijk langs de stammen omhoog. Ik smeerde \pm 60 bomen. Bewolkte lucht, later regen. Warm. Massa's vlinders, ik telde op verscheiden bomen tot 30 stuks, terwijl ik geen enkele boom bij 't smeren had overgeslagen. Het was om wanhopig te worden : ik was alleen, met een zaklantaarn in de ene, een doosje of de vangfles in de andere hand. Het krioelde door en over elkaar. Toen ik ruim de helft der bomen langs geweest was, had ik geen bergruimte meer en daar het flink begon te regenen, heb ik naar de rest maar niet meer omgezien. E e n a v o n d , o m n i e t w e e r t e v e r g e t e n !

Zaterdag 29 Juni 1935 : Weer terug geweest, met m'n oudste zoontje, om hem ook eens van dit schouwspel te laten genieten. Het experiment gelukte volkomen, want hoewel het iets minder druk was dan des Donderdags, was de avond toch zéér goed. Deze beide avonden ving ik verschillende nieuwe soorten voor de Bijvank, o.a. een aantal exx. van *Agrotis obscura* Brahm, 1 ex. van *Agrotis orbona* Hufn., waarvan me 2 exx. ontsnapten, vrij veel *Agrotis brunnea* F., *Agrotis occulta* L., *Mamestra advena* F., *Mamestra tinctoria* Brahm, verscheiden *Leucania impudens* Hb., *Petilampa arcuosa* Hw. en vele andere gewone en minder gewone soorten. Ook hier was *Agrotis exclamatoris* L. een der talrijkste bezoekers !

Woensdag 3 Juli 1935 : Weer gesmeerd, op dezelfde plaats. Koeler, aantal vlinders heel wat minder. Toch nog 3 nieuwe voor de Bijvank.

Zaterdag 6 Juli 1935 : Nog eens geprobeerd ! Guur, lichte maan. Veel minder dieren, meest *Hadena monoglypha* Hufn.

In deze 14 dagen, in hoofdzaak echter op de beide goede avonden, 27 en 29 Juni, kreeg ik \pm 70 soorten op smeer. Tot dit aantal kwam ik naderhand thuis. Het waren de soorten, die ik had meegenomen en die ik me met zekerheid kon herinneren. In werkelijkheid zijn 't er meer geweest.

Ik gebruikte als smeer in die dagen stroop, met overrijpe aardbeien vermengd, en een scheutje bier. Aanvankelijk was ik geneigd het succes voor een deel aan dit mengsel toe te schrijven, maar wijl anderen in dezelfde periode elders hetzelfde hebben ondervonden, moet de oorzaak daarvan m.i. in klimatologische invloeden gezocht worden.

Ik voor mij geloof trouwens niet meer, dat de samenstelling van het „smeer” veel invloed heeft op de „aantrekkingskracht” ervan.

Lobith.

L. H. SCHOLTEN.