

4426. *Bankesia staintoni* Wlsghm.
 4706. *Nemotois vioellus* Z. S. T. XXXII. 54.
 4726. *Adela ochsenheimerella* Hb.

2161. *Grapholitha nebritana* Tr. moet vervallen.

In 1927 was het aantal 988. Hierbij komen nu 20 soorten, terwijl er ééne vervalt, zoodat er nu 1007 als inlandsch bekend zijn.

Nijmegen, Juli 1929. H. J. LYCKLAMA à NIJEHOLT.

Eene tweede generatie van *Smerinthus populi* L.

Naar aanleiding van het verzoek van Dr. J. Th. OUDEMANS in de Ent. Ber. No. 113, omtrent het voorkomen eener tweede generatie bij *Smerinthus populi*, kan ik mededeelen, dat door mij op 18 Augustus 1925 te Amsterdam een prachtig ♂ van deze soort op kunstlicht gevangen werd. De absolute gaafheid van het dier doet mij besluiten, dat het kort te voren uit de pop moet zijn gekomen. Hoewel ik elk jaar exemplaren dezer soort uit de rups kweek, heb ik nog nooit zoo laat in het jaar een exemplaar uit eene overwinterde pop gekregen. Mocht ik nog meer exemplaren zoo laat in het jaar vangen, dan zal ik hiervan melding maken.

Amsterdam. G. S. A. VAN DER MEULEN.

Eenige technische aantekeningen.

Hoe wordt een rupsenhuid in Canadabalsem ingesloten?

Onderstaande methode heeft betrekking op het maken van preparaten van huidjes van naakte rupsen. De resultaten, welke ik er mede verkreeg, zijn zoo bemoedigend, dat ik gemeend heb, ze in bredere kringen bekend te moeten maken.

De te prepareeren levende rups wordt even ondergedompeld in alcohol van 90%; zoodra ze dood is (na eenige seconden) wordt ze er uit genomen, de huid aan de buikzijde overlans opengeknijpt en afgespoeld in leidingwater. De ingewanden en de verdere lichaamsinhoud kunnen met behulp eener kromme naald en een pincetje vrij volledig