

b.v. *Echium vulgare*, althans in de duinen, zeer gezocht is door *Metopsilus (Deilephila) porcellus* L.

Schovenhorst, Putten (G.), October 1929.

J. TH. OUDEMANS.

### **Chrysophanus dispar Haw. in het Naardermeer.**

In aansluiting aan hetgeen ik in de Ent. Ber. No. 169, pag. 2, betreffende *Chrysophanus dispar* beloofde mede te deelen, wil ik thans het volgende daaraan toevoegen.

Op 30 Juli 1929 heb ik, in gezelschap van de Heeren G. A. GRAAF BENTINCK en R. A. POLAK, het Naardermeer bezocht, met het doel, te constateeren, of er ook *dispar*-vlinders vlogen. Wij hebben van 11 tot ongeveer 3 uur ter plaatse goed rondgekeken, doch hebben geen enkelen *dispar*-vlinder kunnen ontdekken, hetgeen vermoedelijk te wijten was aan den hevigen wind, die, toen wij ter plaatse waren, kwam opzetten. Ook zochten wij nog op de zuringplanten, waarop de 14 overwinterde rupsen waren uitgezet, naar pophulzen, doch ook hiervan was niets te bespeuren. Na dien datum ben ik niet meer in de gelegenheid geweest, het terrein nog eens te bezoeken.

Gezien het negatieve resultaat, is het gewenscht, en ook mijn plan, om in het voorjaar van 1930 de proef op grootere schaal te herhalen. Het laat zich aanzien, dat er dan meer kans op succes zal bestaan, daar ik momenteel over een zeer groot aantal rupsen beschik, die, naar ik hoop, den winter met goed gevolg zullen doorstaan. Ook hierover hoop ik ter gelegener tijd het resultaat bekend te maken. Moge de uitslag dan gunstig zijn.

Amsterdam, October 1929.

J. H. E. WITTPEN.

### **Vanessa urticae L. ab. alba Ray.**

Een der Amsterdamsche verzamelaars, de Heer P. N. SINT, ving einde Augustus van di jaar, in de onmiddellijke nabijheid der hoofdstad, een albinistisch exemplaar van *Vanessa urticae* L., dat wel verdient, nader omschreven te worden. Op de bovenzijde der vleugels is de zwarte teekening geheel normaal; de grondkleur is echter, in plaats van oranjerood, zuiver wit. Onderzijde normaal. Het dier, dat zich in