

vermeld, dat *P. quadrata* een ca. 3-3.5 mm. lang diertje is, dat op de bovenzijde eene eigenaardige netachtige structuur vertoont, met onregelmatig verspreide donkere vlekken op de geelgrijze oppervlakte, zoodat het, zittend op boomchors of aarde, weinig in het oog valt. Interessant is, dat de beschrijving, die FIEBER omstreeks het jaar 1845 ervan gegeven heeft, nog altijd even voortreffelijk blijkt en alleszins voldoende is, om de soort te herkennen, al zijn sindsdien nog een paar andere onderscheidingskenmerken gevonden.

Hilversum, April 1930.

A. RECLAIRE.

Merkwaardige Vlindergewoonten.

Mijne woning op Schovenhorst te Putten heeft muren, welke aan de buitenzijde met eene cementlaag bedekt zijn, die in eene lichte, eenigszins roseachtige kleur gesilicateerd zijn. Als versiering zijn in die cementlaag lijsten en vakken aangebracht. Ter plaatse, waar twee gevels elkander ontmoeten, en een hoek maken, is op elk van beide gevels eene verticale rij van elf langwerpige vakken aangebracht. De vakken, aanvangend op ruim één meter van den grond, reiken juist zoo hoog als de benedenverdieping. Zij zijn ongeveer 50 cm. breed, en 30 cm. hoog, en bestaan elk uit een gladden buitenrand, en een daardoor omsloten binnenvak van ongeveer 40 bij 15 cm. Van deze elf boven elkander liggende binnenvakken zijn de evene nummers glad, de onevene ruw.


Het merkwaardige is nu, dat, terwijl slechts zeer zelden andere Noctuiden op een der genoemde binnenvakken overdag rustend worden aangetroffen, er sedert vele jaren nooit een zomer voorbijgaat, zonder dat dit met meerdere ex. van *Acronycta aceris* L. wèl het geval is, en dan uitsluitend op de ruwe vakken. De gewone tijd is de tweede helft van Juni en de eerste helft van Juli, zoodat wij er op getraind zijn, tegen dien tijd op te letten, „of ze er weer zitten”. Nooit heb ik een ex. elders op de muren van het huis zien rusten, alhoewel ik dikwijls daarnaar gezocht heb.

Andere vlindersoorten trof ik, zooals reeds vermeld werd, op de genoemde vakken (zoo ook elders op deze muren) zoo goed als niet aan; alleen in 1924 een paar ex. van *Mamestra serena* F., die in dat jaar buitengewoon talrijk voorkwam.

Waarom *Acronycta aceris* juist die door andere vlinders niet gefrequeenteerde vakken, en daarvan uitsluitend de ruwe, tot rustplaats uitkiest, zal wel niet licht uit te maken zijn, doch merkwaardig is het zeker. Iets, dat op bescherming gelijkt, kan ik er niet aan ontdekken. De vlinders zijn gemakkelijk zichtbaar, vooral als de zon er op schijnt, waarvoor zij zich niet verplaatsen.

Schovenhorst, Putten,
Juni 1930.

J. TH. OUDEMANS.




Inventarisatie van terreinen, belangwekkend uit Entomologisch oogpunt.

In aansluiting aan de mededeeling in No. 171 der Entomologische Berichten, Januari 1930, kan ik mededeelen, dat thans inlichtingen door het Staatsboschbeheer te Utrecht ingewacht worden omtrent de provincie Noordbrabant. Gemakshalve kunnen de leden der Ned. Ent. Ver. de opgaven aan ondergeteekende toezenden.

Schovenhorst, Putten,
Juni 1930.

J. TH. OUDEMANS.



Adresverandering.

H. COLDEWEY, thans: „Nieuw-Veldwijk”, Twello.

Dr. L. J. TOXOPEUS, thans voorloopig: 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, Java.

