

M. laevinodis Nyl.
 Lasius niger L.
 L. fuliginosus Latr.
 Tetramorium caespitum L.
 Formica fusca L.

Hilversum, Juni 1930.

A. RECLAIRE.

====

**Eidophasia messingiella F. R.,
 een voor de Nederlandsche Fauna nieuw
 Microlepidopteron.**

Van deze nog niet in ons land aangetroffen vlindersoort werd in Juni 1929 een exemplaar gevangen aan den oever van de rivier de Mark bij Breda, op eene plaats, waar de voedselplant, *Cardamine amara* L., bittere veldkers, groeide.

STAUDINGER-REBEL en SPULER geven op, dat de soort in geheel midden- en noord-Europa voorkomt, behalve in Frankrijk, Nederland en het hooge noorden. Toch geloof ik niet, dat wij hier met een voor Nederland nieuwen immigrant te doen hebben. De eerst thans gedane ontdekking als inlandsche soort komt mij voor, veeleer te moeten worden toegeschreven aan ééne of meer der volgende oorzaken:

1^o *Cardamine amara* is ten onzent vrij zeldzaam;

2^o Deze plant groeit op moerassige, in den regel moeilijk bereikbare plaatsen;

3^o De soort lijkt bij oppervlakkige beschouwing zeer veel op de bekende, fraaie *Adela croesella* Sc., en zou daarmee verward kunnen zijn geworden. Van deze soort is echter *Eidophasia messingiella* te onderscheiden o. a. door de aanmerkelijk kortere sprieten, zoowel als door de rechtuitstekende, gebaarde palpen, met opstaand, gladbeschubd eindlid.

Het exemplaar berust in mijne collectie.

Breda, April 1930.

P. HAVERHORST.

====

Acarologische Aanteekeningen CIV.

Kleemannia nov. gen. — C. F. KLEEMANN, de schoonzoon van A. J. RÖSEL VON ROSENHOF, is algemeen bekend;