

bij zich hebben, ze een langen weg kunnen afleggen, om het te vinden. De rupsjes, die in het laatst van April uitkwamen, kropen door het gaas uit de kist, een eindje over den vloer van den bijenstal, langs een der stijlen naar boven, verder over het dak; toen ze dit ten einde waren weer langs een stijl naar beneden, een eindje over den grond, totdat ze een bijenkast bereikten, die buiten den stal staat. De kast beklommen ze, tot een hevige regenbui een eind aan den tocht maakte. De afgelegde weg, die door een spinselband kenbaar was, is ongeveer acht meter lang. Indien dus een boomtak, waarop zich eieren van *M. neustria* bevinden, afsterft, zullen de uitgekomen rupsen ongetwijfeld haar voedsel bereiken.

R. A. POLAK.

---

### Cicindelalarve.

Omtrent onze Cicindela's vindt men vermeld, dat zij overwinteren òf als imago, òf in den popstoestand. Op 12 April j.l. diepte ik echter uit eene gang op heidegrond eene halfvolwassene larve op. Een geval van overwintering der larve of van, ondanks alle voedselschaarschte, buitengewoon vroege ontwikkeling? Aan Heeren Coleopterologen zij in dezen de beslissing overgelaten.

Breda, 28/5 '31.

P. HAVERHORST.

---

### Boekbespreking.

A History of Economic Entomology (somewhat anecdotal), with 51 plates, by L. O. HOWARD (Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 84; publication No. 3065 of the Smithsonian Institution).

Washington 1930.

De meeste entomologen, die er eene eenigszins uitgebreide bibliotheek op na houden, lezen hunne boeken niet van a tot z door; men wenscht nu eens de eene bladzijde, dan weder eene andere te raadplegen, veelal slechts enkele regels, en ik durf gerust zeggen, dat er in mijne bibliotheek zeer vele bladzijden zijn, waarop mijn oog nimmer heeft gerust,