

Jeudi 21 Juillet

- 10 heures: Séance générale.
 14 heures: Séances de Sections.
 20 heures: Banquet.

Vendredi 22 Juillet

- 10 heures: Séances de sections.
 14 heures: Excursion à Versailles et dans la vallée de Chevreuse.

Samedi 23 Juillet

- 10 heures: Séances de sections.
 15 heures: Séance de clôture.

Dimanche 24 Juillet

Départ pour une excursion de plusieurs jours dans les Pyrénées.

Pendant toute la durée du Congrès, des excursions en autocar seront organisées chaque jour, permettant aux Congressistes de visiter agréablement Paris et ses environs.

Het adres van het Algemeen Secretariaat van het Congres is:

Dr. R. JEANNEL, 45bis, rue de Buffon, Paris (5e). Voor alle inlichtingen vervoegte men zich aldaar.

HET BESTUUR DER NED. ENT. VER.

NEDERLANDSCHE MICROLEPIDOPTERA.

Tweede Vervolg op de „Naamlijst van de Nederlandsche Microlepidoptera, samengesteld door DR. H. J. LYCKLAMA à NIJEHOLT, 1927”.

No.

- 248 Homoeosoma saxicola Vaughan. S.T. XXXII. 41.
 — Homoeosoma snellenella Bentinck. T. LXXIII. 237.
 2250 Pamene nitidana F. S. 385.
 2438 Eidophasia messingiella F. R.
 2703 Gelechia salicorniae Hering.
 2711 Gelechia junctella Dgl. S. 626. noot.
 2875 Ptocheuusa subocellea Sph.
 2942 Paltodora cytisella Curt. S. 705. noot.

- 3054 *Blastobasis phycidella* Z. S. 433. noot.
3891 *Coleophora artemisicolella* Brd. S. 801. noot.
4225 *Phyllocnistis sorhageniella* Lüders.
4446 *Solenobia inconspicuenta* Stt. S. 445. noot.
— *Talaeporia guenei* Z. moet vervallen. (na 4423).

Volgens het EERSTE VERVOLG, Entom. Ber. No. 169, 1 Sept. 1929, blz. 9, bedroeg het aantal inlandsche soorten 1007. Dit wordt thans met 12 vermeerderd, en met 1 verminderd, zoodat er nu 1018 soorten als inlandsch bekend zijn.

Nijmegen, Februari 1932. H. J. LYCKLAMA à NIJEHOLT.

Pyrameis cardui L. in 1931 weder in grooten getale te Amsterdam aanwezig.

Als vervolg op mijne mededeeling in de E. B. van 1 Sept. 1931, kan ik berichten, dat ik begin Aug. 1931 geene rupsen op genoemd terrein meer ontdekte. Het verdere gedeelte van die maand ging ik met vacantie, zoodat ik toen geene waarnemingen kon doen. In September teruggekomen, ging ik den 15^{den} eens op zoek, en vond, evenals in Mei, wederom een groot aantal rupsen op hetzelfde terrein. Het was wel iets minder dan voorheen, doch het aantal was toch groot te noemen.

Ik verzamelde er een 25-tal, bijna volwassen, half volwassen en ook een zeer klein exemplaar, naar schatting een millimeter of zeven lang. Ik kweekte ze weer op de gewone wijze, met distelplanten voedende, en zag ze tusschen 23 Sept. en 20 Oct. op ééne na alle verpopt. De nog niet verpopte rups was het bewuste exemplaar, dat ik vond, toen het nog zeer klein was, zooals boven vermeld, en hetwelk ik apart had gehouden. Van al de poppen waren er twee naar beneden gevallen, die ik op den bodem van een kistje legde en binnenshuis bewaarde (niet opzettelĳk) in eene kamer, waar niet gestookt wordt en die op het Noorden ligt.

Nu kwam de laatste week van October, die zich kenmerkte door eene lage temp. en waarbij hier in den nacht van 27 op 28 Oct. de thermometer daalde tot 3^o C. onder nul.