

grootte witje, *Pieris brassicae* L., over het algemeen groot van stuk waren. Helaas was ik niet in de gelegenheid, om materiaal te verzamelen, en zoodoende maten te nemen. Daarentegen op 22 Augustus 1932 een ♀ van *Ennomos autumnaria* Wernb. (*alniaria* Esp.), gevangen hebbende, dat mij opviel als buitengewoon groot, kon ik de vleugelspanning nagaan. Het ex. meet van vleugelpunt tot vleugelpunt 58 m.m.

SNELLEN geeft voor deze soort 38 tot 52 m.m. op, en MEYRICK 46 tot 52 m.m. Het schijnt dus wel een reuzenexemplaar te zijn. Mijn vraag aan de Lepidopterologen is dus: leverde 1932 inderdaad veel grootte exemplaren op, of is het door mij waargenomene slechts toeval? Ik wil er bijvoegen, dat het mij voor andere insectenorden volstrekt niet opgevallen is, dat er abnormaal veel grootte exemplaren voorkwamen.

Amsterdam, September 1932.

D. MAC GILLAVRY.

TWAALFDE VERVOLG OP HET AANHANGSEL IN
„COLEOPTERA NEERLANDICA III”

(Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche
Coleopteren-fauna L).¹⁾

- Op blz. 64. **Dytiscus lapponicus** Gyll. De Heer *D. C. Geyskes* ving bij Nuland (N. Brab.) een ♂ met talrijke, fijne, gele langlijnen op de dekschilden. Met mijn dank werd dit ex. voor de standaardcollectie aanvaard.
No. 468 van de Nieuwe Naamlijst.
- „ „ 120. **Staphylinus melanarius** Heer (globulifer auct.). ♂♂ bij Amsterdam, Muiden, Bussum, Tiel, Valkenburg (Limb.), St. Pieter, Kolhorn en Haarlem; ♀♀ bij Muiden, Valkenburg (Limb.), Rotterdam, Arnhem, Loosduinen, den Haag, Utrecht, Breda, Amsterdam, Tiel en

¹⁾ Dit 12de Vervolg heeft Dr. *Everts* nog zelf geheel gereed gemaakt. Hij stelde het, kort voor zijn overlijden, aan den heer *Van der Wiel* ter hand ter publicatie. Deze laatste geeft er echter de voorkeur aan, dat deze bijdrage ongewijzigd en niet aangevuld nog onder den naam van Dr. *Everts* verschijnt. J. Th. O.

- Op blz. 120. Zutphen; de a. **rubidus** Verh. bij Wolfhezen.
No. 920 van de N. N.
- „ „ 120. **Staphylinus Winkleri** Bernh. ♂♂ bij Schin
op Geul (Limb.), Wijre en den Haag; ♀♀ bij
Leiden en Valkenburg (Limb.).
No. 920^{bis} van de N. N.
- „ „ 120. **Staphylinus siculus** Stierl. ♂♂ bij Muiden,
den Haag, Arnhem en Loosduinen; ♀♀ bij
Doornenburg (Geld.), Leiden en Maastricht.
No. 920 2^{bis} van de N. N.
- „ „ 185. **Liodes picea** Ill. Ik vind in mijne collectie
een ex. van de a. **flavipennis** Fleisch.
uit Hilversum (18, VIII, '26), destijds, met mijn
dank, van Dr. A. Reclaire ontvangen en door
Dr. A. Fleischer gedetermineerd.
No. 1418 van de N. N.
- „ „ 204. **Hister ignobilis** Mars. De Heer W. Hel-
linga ving bij Aalst (N. Br.) één enkel ex.,
dat, met mijn dank, voor de standaard-collectie
ontvangen werd.
No. 1528^{bis} van de N. N.
- „ „ 343. **Microcara testacea** L. var. **Bohemanni**
Mnnh. Bij Venlo, Arnhem, Terborg, Winters-
wijk, Bergen-op-Zoom, Baarn en Beetster-
zwaag. Deze var. werd, o.a. door Reitter, als
goede soort gerekend, maar is voorzeker niets
anders dan eene kleinere afwijking, met meer
verspreide bestippeling, smaller halsschild met
breedere en sterker afgezette en opgebogen
zijanten, en zonder duidelijke langslijnen op
de dekschilden. Er zijn ook overgangsvormen.
No. 2336 van de N. N.
- „ „ 427. **Labidostomis humeralis** Schneid. Bij
Exaten (L.), Juni, één enkel ex. met **L. tri-**
dentata L., dat door Prof. Dr. Rüschkamp
S. J., met mijn dank, voor mijne collectie
werd afgestaan.
No. 2753^{bis} van de N. N.

- Op blz. 445. **Phyllobrotica quadrimaculata** L. ab. **munda** Weise. Dr. A. Relaire ving bij Kortenhoeve (N. Holl.), Juli, één enkel ex., dat, met mijn dank, voor de standaard-collectie aanvaard werd. No. 2863 van de N. N.
- „ „ 601. **Ceuthorrhynchus T-album** Gyll. Bij Noordwijk en den Haag. No. 3224^{bis} van de N. N.
- „ „ 648. **Xylosandrus morigerus** Blandf. Schadelijk in Orchideeën-kassen aan *Dendrobium phalaenopsis* Fitzg., in Wageningen, Dec. 1930. Van Dr. D. L. Uyttenboogaart ontving ik, met mijn dank, een viertal ex. (♀♀). Het ♂ werd sedert ook gevangen. No. 3578^{bis} van de N. N.

Den Haag.

ED. EVERTS.

Nederlandsche Hydrachnidae. Over het sub-genus *Pilolebertia* S. Thor.

Bij de palaeartische soorten van dit subgenus staat aan de binnenzijde van het 3e palplid de middelste distale borstel in den regel \pm halverwege de dorsale en de ventrale. Alleen bij *insignis* NEUM. zouden M.- en V.-borstel elkaar dicht genaderd zijn en zou volgens THOR deze soort daardoor direct van alle andere *Pilolebertia*-soorten te onderscheiden zijn. Wij kunnen de variabiliteit van dit kenmerk als volgt in cijfers weergeven. Meten we van een palp de afstanden DM en VM en wordt nu in elk geval $MV=1$ genomen, dan vinden we voor DM een getal, dat aangeeft hoeveel maal de afstand DM grooter is dan MV. Opmetingen aan 46 palpliden van ♂♂ en ♀♀ gaven de volgende uitkomsten:

DM	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3			2.3	2.4	
Ex.	2	3	7	4	1	1	1			1	0	
	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
	1	2	2	1	3	3	3	1	0	3	1	1
	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1			5.6			6.4	
	1	0	1	0	1			1			1	