

**Cosymbia (Ephyra) quercimontaria Bastelb.
is inlandsch!**

Zeer toevallig kwam ik in kennis met den Duitschen entomoloog RUDOLF BOLDT te Berg en Dal bij Nijmegen. In den loop van onze correspondentie bleek mij, dat deze heer, onbewust van de groote faunistische beteekenis van zijn vondst, bij zijn woonplaats maar liefst ruim een twintigtal rupsen van *Cosymbia quercimontaria* buitgemaakt had. Reeds vroeger had hij eens den vlinder aangetroffen bij het opkweken van een groot aantal rupsen van *Cos. punctaria* en *porata*, afkomstig van Nijmegen (Heilige Land). Reeds dadelijk zijn dus twee vindplaatsen van dit aardige spannertje bekend en zeker zullen er meer volgen, wanneer in het Oosten van ons land het eikenhout en de berken systematisch afgeklopt worden.

De rups is van die der andere *Cosymbia*'s onmiddellijk te onderscheiden, doordat ze op ring 3-8 op den rug donkerbruine ruiten vertoont, wat volkomen overeenstemt met de ervaringen van den heer BOLDT.

Voor de verschillen der vlinders verwijs ik naar de oorspronkelijke beschrijving van BASTELBERGER in de „Stettiner entom. Zeitung”, vol. 58, p. 120-125, en 220-228, 1897. Ook in TER HAAR-KEER is de soort goed behandeld.

Van de overige vondsten van genoemden entomoloog is, behalve eenige merkwaardige *Rhopalocera*-vormen, waarop ik later terug hoop te komen, vooral van belang de vondst van eenige rupsen van *Larentia fluviata* Hb. bij Nijmegen.

Amsterdam, Oct. 1932.

B. J. LEMPKE.



Plusia moneta F. Larentia silaceata Hb.

In de Ent. Ber. van 1 Januari 1931 (No. 177, Dl. VIII), gewaagt B. J. LEMPKE van een late *Plusia moneta*-vangst (6 Sept. 1930, Amsterdam). In de Ent. Ber. van 1 Mei 1931 (No. 179, Dl. VIII) voegt hij hieraan nog twee andere late data toe: H. COLDEWEY ving een ex. van de soort op 27 Aug. 1930, J. C. WIJNBELT op 2 Sept. 1928. Onzerzijds kan hieraan nog een vierde datum, die zeer sprekend is,