

**Cosymbia (Ephyra) quercimontaria Bastelb.  
is inlandsch!**

Zeer toevallig kwam ik in kennis met den Duitschen entomoloog RUDOLF BOLDT te Berg en Dal bij Nijmegen. In den loop van onze correspondentie bleek mij, dat deze heer, onbewust van de groote faunistische beteekenis van zijn vondst, bij zijn woonplaats maar liefst ruim een twintigtal rupsen van *Cosymbia quercimontaria* buitgemaakt had. Reeds vroeger had hij eens den vlinder aangetroffen bij het opkweken van een groot aantal rupsen van *Cos. punctaria* en *porata*, afkomstig van Nijmegen (Heilige Land). Reeds dadelijk zijn dus twee vindplaatsen van dit aardige spannertje bekend en zeker zullen er meer volgen, wanneer in het Oosten van ons land het eikenhout en de berken systematisch afgeklopt worden.

De rups is van die der andere *Cosymbia*'s onmiddellijk te onderscheiden, doordat ze op ring 3-8 op den rug donkerbruine ruiten vertoont, wat volkomen overeenstemt met de ervaringen van den heer BOLDT.

Voor de verschillen der vlinders verwijs ik naar de oorspronkelijke beschrijving van BASTELBERGER in de „Stettiner entom. Zeitung”, vol. 58, p. 120-125, en 220-228, 1897. Ook in TER HAAR-KEER is de soort goed behandeld.

Van de overige vondsten van genoemden entomoloog is, behalve eenige merkwaardige *Rhopalocera*-vormen, waarop ik later terug hoop te komen, vooral van belang de vondst van eenige rupsen van *Larentia fluviata* Hb. bij Nijmegen.

Amsterdam, Oct. 1932.

B. J. LEMPKE.



**Plusia moneta F. Larentia silaceata Hb.**

In de Ent. Ber. van 1 Januari 1931 (No. 177, Dl. VIII), gewaagt B. J. LEMPKE van een late *Plusia moneta*-vangst (6 Sept. 1930, Amsterdam). In de Ent. Ber. van 1 Mei 1931 (No. 179, Dl. VIII) voegt hij hieraan nog twee andere late data toe: H. COLDEWEY ving een ex. van de soort op 27 Aug. 1930, J. C. WIJNBELT op 2 Sept. 1928. Onzerzijds kan hieraan nog een vierde datum, die zeer sprekend is,


worden toegevoegd. Zooals wij reeds elders mededeelden („De Wandelaar” van Febr. 1932, 4de Jaargang), vloog op 10 Oct. 1931 een zeer versch *Plusia moneta*-voorwerp 's avonds onze verlichte keuken — in Soest — binnen. Het ex., ofschoon het niet werd gevoerd, bleef tot 22 Oct. 1931 in leven. Wij nemen dan ook met LEMPKE aan, dat inderdaad in Nederland — zij het niet als regel, maar misschien toch vaker dan men vermoedt — *Plusia moneta* in twee generaties voorkomt.

In de Ent. Ber. van 1 Mei 1931 (zie boven) citeert LEMPKE eveneens HEYLAERTS, volgens wien de spinsels van rupsen, die zich tot een manlijken vlinder zullen ontwikkelen, wit zijn, terwijl die, waaruit een vrouwelijke vlinder zal voortkomen, geel zijn. Is deze waarneming wél juist? Reeds enkele jaren lang kweeken wij geregeld *Plusia moneta*-rupsen, daar de soort in Soest verre van zeldzaam is. Wij hebben nu de ervaring opgedaan, dat alle spinsels aanvankelijk wit zijn, doch later alle een zwavelgele kleur verkrijgen. Die gele cocons herbergen dan ook poppen, waaruit zoowel manlijke als vrouwelijke vlinders te voorschijn komen.

Ten slotte is het misschien niet oninteressant, hier vast te leggen, dat wij op 13 Aug. 1932 in de Buurtschap „de Pook” (Gemeente Tubbergen) een ex. vingen van de zeldzame *Larentia silaceata* Hb., hetwelk zich thans in de collectie van B. J. LEMPKE bevindt.

Soest, 23 Nov. 1932.

RINKE TOLMAN.



### Ned. Ent. Ver. Afd. Zuid-Holland.

L.S.

In afwijking van de in de convocatie der afd. Zuid-Holland genoemde bijeenkomsten, zal de bijeenkomst op 9 Maart 1933 niet plaats vinden in Hotel „Terminus” te den Haag, maar in het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie, Lange Raamsteeg 2, Leiden.

Wij vertrouwen, dat dit een aanleiding moge zijn voor vele leden der Entomologische Vereeniging, om deze bij-