

Dasychira pudibunda L. ab. concolor Stgr.

In de Ent. berichten van 1 Jan. 1927 no. 153 maakte ik melding van de vangst van *D. pudibunda L. ab. concolor* STGR. op licht, den 15^{den} Mei 1926 te Amsterdam, in welke zelfde berichten gelijktijdig eene beschouwing voorkomt van den Heer Dr. J. TH. OUDEMANS over deze aberratie en het voorkomen hiervan in Nederland, mede in verband met de vangsten van de Heeren Ir. VAN WISSELINGH en wijlen TUTEIN NOLTHENIUS.

Hoewel de Heer J. TH. OUDEMANS in deze beschouwing aandrang op nadere mededeelingen over vangsten van deze *ab. concolor*, heb ik sindsdien niets meer daarover gehoord.

Wat Amsterdam betreft, heb ik na 1926 geen enkel exemplaar van den stamvorm, noch van de ab. op licht zien afkomen.

In de maand Augustus 1932 vertoefde ik te Enschede en klopte in de gemeente Lonneker een drietal jonge rupsen van deze soort, waarvan ik 16 Mei 1933 een ♂ en ♀ van den stamvorm verkreeg, benevens een zeer groot ♀ van de *ab. concolor* (vlucht 59 m.m.).

Dit laatste exemplaar heeft eenkleurig zwartgrijze voorvleugels met een spoor van witte bestuiving; de dwarslijnen zijn geheel verdwenen. Achtervleugels veel donkerder dan bij den grondvorm, de onregelmatige dwarsstreep daarop is nog even te zien.

Naar ik meen is uit den achterhoek van Overijssel (Twenthe) het voorkomen der *ab. concolor* nog niet bekend en zouden we dus nu 5 ver uiteengelegen vindplaatsen kennen, nl. Nijmegen, Leuvenum, Putten, Amsterdam, Lonneker (vlak bij Enschede).

Amsterdam, 30 Juni 1933. G. S. A. V. D. MEULEN.

Lycaeides (Lycaena) argyrognomon Brgrstr. en argus L.

I. Een nieuwe vindplaats van *L. argyrognomon* Brgrstr. Onder mijn talrijk inlandsch materiaal van *L. argus* L. bevond zich een ♂, dat mij reeds dadelijk opgevallen