

*Sterrha sacraria* L.

*Glyphodes unionalis* HB.

**Orthoptera:**

*Locusta migratoria* L.

*Schistocerca peregrida* OLIV.

Gelijktijdig ontvingen wij voor onze Bibliotheek enkele drukwerkjes: Report 1930—31, Hastings and St. Leonards Natural History Society, waarin eene uiteenzetting van het werkplan.

Bulletin of the South-Eastern Union of Scientific Societies No. LXII (June 9, 1933), waarin verslag van de waarnemingen in 1931—1932.

„Migration Records”, overdruk uit het Augustusnummer van *The Entomologist* LXVI, 1933.

„Migration Records”, overdruk uit het Septembernummer van hetzelfde jaar.

Deze laatste twee bevatten een groot aantal goed gedocumenteerde waarnemingen.

Wellicht zal de heer DANNREUTHER nog meerdere dezer drukwerken ter beschikking willen stellen van hen, die zich bereid verklaren, hem hunne waarnemingen tijdig toe te zenden? Zijn adres is: „Windycroft”, High Wickham, Hastings, Sussex.

Namens het Bestuur der Nederl. Entom. Vereeniging,

De Secretaris,

J. B. CORPORAAL.

---

### Albinistische Vlinders.

Albinistische vlinders komen weinig voor en de ontkleuring blijkt dan bijna altijd nog beperkt te zijn tot gedeelten der vleugels. Slechts zelden vertoont de geheele oppervlakte van een of meer der vleugels de albinistische kleur. Een paar fraaie voorbeelden van dit laatste geval verkreeg ik dezer dagen van den heer L. E. D. LANGEVELD alhier: een ♂ en een ♀ van *Epinephele jurtina* L., beide door hem gevangen, resp. in Augustus 1918 te Amersfoort en in Juli 1933 te Breda.

Behalve een smalle witte veeg achter het linkeroog, zijn bij het vrouwelijke exemplaar de voorvleugels normaal, dus

donker grijsbruin met okergeel, gekleurd. De beide achtervleugels zijn echter op de geheele bovenzijde wit, met eene zwakke donkere bestuiving aan den wortel en op den achterrand, welke bestuiving zich op de witte onderzijde wat sterker geprononceerd in licht okergele tint herhaalt.

Merkwaardiger is het andere, mannelijke voorwerp. Niet alleen dat hierbij de vier vleugels, zoowel op de boven- als op de onderzijde, de albinistische kleur vertoonen, maar het donkere pigment is ook grootendeels verdwenen uit de beschubbing en de beharing van de sprieten, de palpen en het achterlijf, terwijl mede de oogen helderder bruin dan die van normale voorwerpen zijn. Van de oorspronkelijke kleur is op de bovenzijde alleen eene zwakke donkere bestuiving overgebleven aan de wortels en eene iets sterkere op de plaats van den zwartbruinen schuinen veeg, terwijl van de oogen nog slechts sporen aanwezig zijn. Op de onderzijde zijn die oogen echter duidelijker, terwijl hier de voorvleugels ook nog tot voorbij het midden eene flauwe okergele beschubbing dragen. De ontkleuring is dus in beide gevallen op de onderzijde minder ver dan op de bovenzijde gegaan.

Breda.

P. HAVERHORST.

### ***Dasychira pudibunda* ab. *concolor* Stgr.**

Naar aanleiding van de mededeeling des heeren G. S. A. V. D. MEULEN in de Entomologische Berichten van 1 Sept. 1933 (No. 193) omtrent *Dasychira pudibunda* L. ab. *concolor* Stgr., moge worden opgemerkt, dat wij, in den loop van Mei 1932, een drietal exemplaren van de soort verzamelend, tot de ontdekking kwamen, dat niet minder dan twee daarvan — onderscheidenlijk gevangen op 13 en 19 Mei — tot de aberratie behoorden en slechts één tot het type. De voorwerpen bevinden zich in de verzameling van den heer B. J. LEMPKE te Amsterdam.

De vondst, waarvan wij indertijd melding maakten in „De Wandelaar” (Jaargang IV, blz. 324), was voor ons aanleiding, ons in verbinding te stellen met dr. J. TH. OUDEMANS te Putten, die ons niet alleen naar het door hem in de Ent. Ber. van 1 Jan. '27 geschreven en thans door den heer V. D. MEULEN geciteerde artikel verwees, maar tevens de vriendelijkheid had, de nadien verschenen