

Globiceps flavomaculatus F.
 Cyrrhorrhinus caricis Fall. **faun. nov. spec.**
 Orthotylus ericetorum Fall.
 „ marginalis Reut.
 Campylomma verbasci H. Schumm.

De door MAC GILLAVRY van *Artemisia maritima* vermelde Orthotylus-soorten en Plagiognathus fusciloris werden niet door mij gevonden; wat ik van deze plant sleepte waren onherkenbare larven.

Hemiptera-homoptera.⁷⁾

Bythoscopus alni Schrk.

Formicidae.⁸⁾

Formica rufibarbis F.

„ „ fusco-rufibarbis Forel
 „ fusca L.

Lasius fuliginosus Latr.

„ niger L.

Tetramorium caespitum L.

Myrmica laevinodis Nyl.

„ scabrinodis Nyl.

A. RECLAIRE.

HILVERSUM, Januari 1926.

Nieuwe naamlijst der Nederlandsche Psylliden.

Hieronder volgt eene voorloopige mededeeling over de verspreiding onzer Bladvlooien.

Mede door de hulpvaardigheid van vele entomologen, was ik in de gelegenheid van deze groep een meer bijzondere studie te maken.

In het bijzonder moet ik hier mijn dank betuigen aan Mr. A. J. F. Fokker van Crayestein van Rengerskerke, die mij zijn geheele materiaal ten geschenke gaf, en aan de heeren Prof. Dr. E. D. van Oort en R. van Eecke voor het ter inzage stellen van het materiaal in het „Rijksmuseum van Natuurlijke Historie” te Leiden.

En niet het minst ook dank ik Dr. D. Mac Gillavry die mij, vooral met het verschaffen der vaak zeer moeilijk te verkrijgen literatuur, ten zeerste heeft geholpen.

7) Dr. MAC GILLAVRY heeft deze dieren voor mij gedetermineerd.

8) De heer P. VAN DER WIEL was zoo vriendelijk deze voor mij te determineeren.

Voor materiaal ter determinatie houd ik mij ten zeerste aanbevolen; ook oudere collecties kreeg ik zeer gaarne ter inzage, evenals buitenlandsch materiaal.

De soorten, die ik niet zelf kon onderzoeken, zijn gemerkt met een?, wat niet steeds wil zeggen, dat aan de juistheid der opgave moet worden getwijfeld.

Liviinae.

- Livia juncorum* Latr. — 's-Gravenhage, Wassenaar, Hilversum (v. d. Goot), Utrecht, Driebergen, Assen, Wageningen, Doetichem, Mook, Oisterwijk, Zundert.
 „ ? *crefeldensis* Mink — Utrecht (Snellen v. Vollenhoven.)

Aphalarinae.

- Aphalara calthae* L. — 's-Gravenhage, Zeeburg, Wageningen, Arnhem, Gorsel (v. d. Goot), Velp, Bunde.
 „ *nervosa* Foerst. — Katwijk.
 „ *picta* Zett. — Apeldoorn, Zundert.
Rhinocola? *targionii* Licht. — „Holland” (Aulmann in „*Psyllidarum Catalogus*”).
 „ *ericae* Curt. — Driebergen, Bergen op Zoom en Epen (v. d. Goot).

Triozinae.

- Trioza urticae* L. — Overal gewoon.
 „ *albiventris* Foerst. — 's-Gravenhage, Diemen, Driebergen, Rhenen, Wageningen (v. d. Goot), Leeuwen, Amersfoort, Arnhem.
 „ *galii* Foerst. — 's-Gravenhage, Wassenaar, Abcoude, Utrecht, de Bilt.
 „ *nigricornis* Foerst. — Wassenaar, (Meijendel.)
 „ *remota* Foerst. — „S. v. V. Br. 10” waarschijnlijk: Brummen.
 „ *saundersi* M-D. — Driebergen.
 „ ? *alacris* Flor. — Santpoort (v. d. Goot).
 „ ? *chenopodii* Reut. — Zeeburg (v. d. Goot.)

Psyllinae.

- Psyllopsis fraxinicola* Foerst. — 's-Gravenhage en omstreken, Leeuwarden, Amsterdam (v. d. Goot) Ulvenhout, Wageningen (v. d. G.), Mook, Epen (v. d. G.), Walcheren.
- „ *fraxini* L. — 's-Gravenhage en omstreken, Amsterdam, Lisse, Bodegraven, Zierikzee, Wageningen (v. d. Goot) Voorst, Empe.
- Arytaena genistae* Latr. — 's-Gravenhage, Noordwijk, Hilversum (v. d. Goot) Amersfoort, de Bilt, Driebergen, Deventer (v. d. G.), Winterswijk, Beek, Mook, Ginneken, Bergen op Zoom, Eygelshoven, Schin op Geulle.
- Psylla buxi* L. — Leeuwarden, Amsterdam en Boskoop (v. d. Goot), Wassenaar, Rotterdam, Zierikzee, Wageningen (v. d. G.), Middelburg.
- „ *parvipennis* Löw. — Texel, Helder, Zandvoort, Noordwijk, Wassenaar, Scheveningen, Haamstede.
- „ *hartigi* Flor. — 's-Gravenhage, Wassenaar, Staalduin, Harderwijk.
- „ *alni* L. — 's-Gravenhage, Overveen en Wijk a/Zee (v. d. Goot).
- „ *mali* Schmiedb. — Koudum, Lekkum, Leeuwarden, Amsterdam (v. d. Goot als „*P. peregrina* Foerst.”) Leiden, Wassenaar, Linschoten, Driebergen, Wageningen (v. d. G. als *P. peregrina*), Arnhem, Gorsel (v. d. G.), Ommen, Denekamp, Beek, Valkenburg (L.).
- „ *nigrita* Zett. — 's-Gravenhage, Overveen, Bodegraven, Zierikzee, Rhenen, Putten, Arnhem.
- „ *saliceti* Foerst. — Hilversum (v. d. Goot), Winterswijk, Oisterwijk.
- „ ? *melanoneura* Foerst. — Wageningen en Wijk aan Zee. (v. d. Goot).
- „ *foersteri* Flor. — Overal gewoon.
- „ *spartii* Guér. — Noordwijk, Driebergen, Beek, Ginneken, Bergen op Zoom.
- „ *pyricola* Foerst. — „Gliph.” (is: Gliphoeve, Heemstede).

hippohaes Foerst. — Wijk a/Zee, IJmuiden,
Bloemendaal, Renesse, Katwijk, Was-
senaar, 's-Gravenhage, Zierikzee,
Haamstede, Vlissingen (v. d. Goot.).

VOORBURG (Z.H.)

H. C. BLÖTE.

Een waarschijnlijk nieuwe *TERIAS*-vorm van Boeroe.

In mijn collectie bevindt zich een paar *Terias candida* Cram. van Boeroe, dat als volgt afwijkt van de Ambon exemplaren van dien naam.

♂: Grondkleur lichter geel. — Apex langer gerekt, waar-
door zwarte marginale band rond alle vleugels op den
apex circa $1\frac{1}{2}$ m/m breeder wordt.

♀: Vertoont zelfde eigenschappen als ♂, wat betreft
zwarte omlijning der vleugels, speciaal van den apex der
voorvleugels.

Verder is het basale deel der vleugels bovenzijde geheel
wit, behoudens een minimale lichtbruine bestuiving van het
basale deel aller vleugels en het anale deel der achtervleugels.
Bij mijn Ambon ♀ is deze bestuiving veel zwaarder en
uitgebreider.

Onderzijde minder helder geel dan bij Ambon ♀.

Voorvleugellengte Boeroe exemplaren: ♂ 23 mm., ♀ 20 mm.

„ „ Ambon „ ♂ 23 „ ♀ 24 „

Waar de Boeroe vorm zeer merkbaar afwijkt van den
typischen Ambon vorm, meen ik dezen te mogen noemen
Terias candida exalbescens form. nov.

J. H. JURRIAANSE.

ROTTERDAM, 17 December 1925.

Acarologische Aanteekeningen LXXX.

RECTIFICATIE.

De naam van den Gouvernements-Arts is DR. PH. F.
KOPSTEIN, niet ROPSTEIN. Men verbeterde dus in de
Entomologische Berichten van 1 Nov. 1925, No. 146,
p. 29. r. 13 v. o. en r. 10 v. o.; p. 32. r. 18 v. o. en p. 33.
r. 13 v. o. de aldaar voorkomende fouten,