

N.B. De heer VAN DER WIEL was zoo vriendelijk mij nog eenige gegevens te verstrekken omtrent door hem bij mieren gevonden coleoptera. Verschillende ervan behooren zonder twijfel tot de toevallige gasten, misschien is dit echter niet het geval met de volgende soorten: Bij *Formica exsecta*: *Sipalia caesula*, *Falagria obscura*, *Oligota atomaria* ER., *O. pussilima*, *Xantholinus linearis*, *Monotoma conicollis*. Bij *Formica rufa*: *Sipalia caesula*, *Mycetoporus brunneus* MRSH. met de *a discophorus* REY, *Othius myrmecophilus*, *Xantholinus linearis*. Bij *Lasius alienus*: *Falagria obscura* en bij *Lasius fuliginosus*: *Falagria obscura* en *Tachinus fimetarius* GRAV. a. *Pecirkae* RTT.

In een nest van *Lasius alienus* vond ik zelf ook *Xantholinus linearis*, het schijnt dus, dat deze *Xantholinus* toch wel in een of andere betrekking tot mieren staat.

Dr. EVERTS is zoo vriendelijk geweest de beide lijsten door te zien en mij daarbij nog menige aanwijzing te geven. Ook de heeren Dr. STÄRCKE en VAN DER WIEL hebben mij diverse aanwijzingen gegeven.

A. R.

### Eenige voor onze Fauna nieuwe Hemiptera uit Meijendel.

In het Augustus-nummer van „De Levende Natuur” komt een verslag voor over de tot nu toe in het duinterrein van Wassenaar gevangen wantsen, cicaden en bladvlooien. Hierbij wordt een zevental soorten als nieuw voor de Fauna vermeld, n.l.:

*Brachysteles parvicornis* Costa.

*Megaloceraea (Trigonotylus) psammaecolor* Reut.

(onlangs ook op Terschelling verzameld door DR. RECLAIRE, zie Ent. Ber. 148. Ook bezit ik een exemplaar uit Katwijk aan zee).

*Scolopostethus pilosus* Reut.

*Eurysa lurida* Stål

*Delphax albifrons* Fieb.

*Zygina parvula* Boh.

*Trioza nigricornis* Foerst. (reeds vermeld in de Psylliden-naamlijst, Ent. Ber. 148).

Alle bovengenoemde soorten – met uitzondering van *Scolopostethus pilosus* Reut. – zijn in dat artikel tevens afgebeeld, meestal naar teekeningen van den heer J. F. OBBES.

Tevens bevat het afbeeldingen van:

*Phyllontocheila ciliata* Fieb. (volgens STICHEL: *Tingis reticulata* H.S.); *Psylla parvipennis* Löw en *P. hartigi* Flor.

Voorburg (Z.H.).

H. C. BLÖTE.

### Het voorkomen van *Microtoma atrata* Goeze in Zuid-Limburg.

Tijdens een kort Pinksterverblijf in Zuid-Limburg gelukte het mij, een paar Hemiptera te vinden, die niet in FOKKER's bekende lijsten zijn vermeld. Ofschoon dit volstrekt nog niet wil zeggen, dat zij inderdaad nog niet in ons land zijn gevonden, komt het mij toch wenschelijk voor, de vondsten kort te memoreeren met het oog op de nog zeer onvolledige kennis van de Nederlandsche Hemiptera.

Het zijn de volgende soorten, resp. variëteiten:

***Microtoma atrata* GOEZE** (*Lygaeidae*): eenige ex. 22. & 24. 5. 26 te Schin op Geul op een steenige zonnige helling, vermoedelijk onder *Echium*, te zamen met *Emblethis verbasci* F. Beide liepen bij het oplichten van de planten zeer snel rond. Zeer zeker zijn het overwinterende ex. en zal *Microtoma* in de herfst ter zelfde plaatse in grooter aantal te vinden zijn. Het ca. 9 m.m. lange diertje is door zijn diepzwarte kleur zeer kenbaar, herinnert in habitus iets aan de Cydnide *Brachypelta aterrima* FORST., die in ons gebied nog niet is gevonden. Ook de heer van der Wiel vond 22. 5. 26. *Microtoma* ter zelfder plaatse.

***Drymus sylvaticus* var. *picus* REY** (*Lygaeidae*). Schin op Geul 22. 5. 26. Fokker vermeldt deze onbeduidende variëteit van den zeer algemeen onder bladeren etc. voorkomenden *Drymus sylvaticus* niet, misschien wel terecht, gezien de groote variabiliteit van de Hemiptera. Zij onderscheidt zich van het type alleen door de zeer donkere kleur,