

*Trioza nigricornis* Foerst. (reeds vermeld in de Psylliden-naamlijst, Ent. Ber. 148).

Alle bovengenoemde soorten – met uitzondering van *Scolopostethus pilosus* Reut. – zijn in dat artikel tevens afgebeeld, meestal naar teekeningen van den heer J. F. OBBES.

Tevens bevat het afbeeldingen van:

*Phyllontocheila ciliata* Fieb. (volgens STICHEL: *Tingis reticulata* H.S.); *Psylla parvipennis* Löw en *P. hartigi* Flor.

Voorburg (Z.H.).

H. C. BLÖTE.

### Het voorkomen van *Microtoma atrata* Goeze in Zuid-Limburg.

Tijdens een kort Pinksterverblijf in Zuid-Limburg gelukte het mij, een paar Hemiptera te vinden, die niet in FOKKER's bekende lijsten zijn vermeld. Ofschoon dit volstrekt nog niet wil zeggen, dat zij inderdaad nog niet in ons land zijn gevonden, komt het mij toch wenschelijk voor, de vondsten kort te memoreeren met het oog op de nog zeer onvolledige kennis van de Nederlandsche Hemiptera.

Het zijn de volgende soorten, resp. variëteiten:

**Microtoma atrata** GOEZE (*Lygaeidae*): eenige ex. 22. & 24. 5. 26 te Schin op Geul op een steenige zonnige helling, vermoedelijk onder *Echium*, te zamen met *Emblethis verbasci* F. Beide liepen bij het oplichten van de planten zeer snel rond. Zeer zeker zijn het overwinterende ex. en zal *Microtoma* in de herfst ter zelfde plaatse in grooter aantal te vinden zijn. Het ca. 9 m.m. lange diertje is door zijn diepzwarte kleur zeer kenbaar, herinnert in habitus iets aan de Cydnide *Brachypelta aterrima* FORST., die in ons gebied nog niet is gevonden. Ook de heer van der Wiel vond 22. 5. 26. *Microtoma* ter zelfder plaatse.

**Drymus sylvaticus** var. **picus** REY (*Lygaeidae*). Schin op Geul 22. 5. 26. Fokker vermeldt deze onbeduidende variëteit van den zeer algemeen onder bladeren etc. voorkomenden *Drymus sylvaticus* niet, misschien wel terecht, gezien de groote variabiliteit van de Hemiptera. Zij onderscheidt zich van het type alleen door de zeer donkere kleur,

**Liocoris tripustulatus** F. var. **nepeticola** Reut. St. Pieter 22. 5. 26. gesleept, vermoedelijk van Brandnetel, waarop de fraai gekleurde Capside niet zeldzaam is. De variëteit onderscheidt zich vooral door het bijna geheel goudgele scutellum en pronotum. Ongetwijfeld in ons land zeer verbreid.

Bij het zeven van mos (vooral een groote *Bryum*-soort) te Houtem vond ik 24. 5. 26. een *Acalypta*, die DR. GULDE te Frankfort a.M., die ook ditmaal diverse moeilijke soorten voor mij determineerde, als *A. musci* SCHRK. bepaalde.

Vermoedelijk is dit dezelfde soort, die ik voor eenige jaren ter zelfde plaatse vond en waarover DR. MAC. GILLAVRY in het Natuurhist. Maandblad (Bd. 13, 1924, blz. 73) uitvoerig heeft bericht, waarbij hij tot de slotsom kwam, dat de door mij en ook door de heeren Everts en van der Wiel gevonden *Acalyptae* tot *musci*, misschien tot *brunnea* Germ. behooren.

Van den heer van der Wiel ontving ik later nog 8 ex. benevens eenige larven van Houtem 24. 6. 26, die ik naar DR. GULDE zond; hij determineerde de volwassen dieren alle als *musci*, meldde mij echter, dat hij *brunnea* niet bezit. Uit het een en ander blijkt wel, dat de bewuste *Acalypta* te Houtem niet zeldzaam is; misschien zijn het weer overwinterende ex. geweest en is de soort later in aantal te vinden. Iets dergelijks nam ik te Hilversum waar met *Acalypta parvula*, die ik gedurende den voorzomer op een heideplek, die ik geregeld bezoek, niet vond, totdat ik de soort 9. 8. 26, na een korte afwezigheid, aldaar in aantal in aantal aantrof.<sup>1)</sup>

Hilversum, Augustus 1926.

A. RECLAIRE.

---

1) Hetzelfde geldt voor vele andere Hemiptera, die men onder heideplanten en dergelijke aantreft; zoo vond ik *Berytus signoreti* FIEB. op dezelfde heideplek gedurende dit voorjaar niet of weinig; later verschenen groene larven en 14. 7. 26 vond ik de soort voor het eerst weer in groot aantal.