

kosten ter plaatse gering zijn. Wij meenen, alle kosten, incl. alle normale persoonlijke uitgaven en extra's, te mogen stellen op hoogstens 1500 Nederl. guldens, indien gebruik gemaakt wordt van de 3e klasse touuristen-accomodatie, waarvan verreweg de meeste deelnemers zich zullen bedienen, en op \pm f 2000.—, indien men aan boord 1e klasse wenscht te reizen.

In elk geval is het ieder, die van plan mocht zijn, er heen te gaan, ten sterkste aan te raden, zijne passage, 1e of 3e klasse, te bestellen door bemiddeling van het comité, waarvan Dr. K. Jordan te Tring permanent secretaris is, of van den secretaris der N. E. V. Het is van veel belang, zich zoo spoedig mogelijk aan te melden, daar het comité dan allicht voordeelijker voorwaarden voor passage, bespreking van couchettes enz. zal kunnen bedingen.

Indien iemand zijne vrouw, dochter(s) of zoon(s) wil medenemen, zoo kunnen die als „associate members” het congres medemaken, en mee profiteeren van de faciliteiten.

Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door den

Secretaris der N. E. V.

J. B. CORPORAAL,
Zoölogisch Museum,
Plantage Middenlaan,
Amsterdam C.

ACHTSTE VERVOLG OP HET AANHANGSEL
IN „COLEOPTERA NEERLANDICA III”
(Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche
Coleopteren-fauna XLVI).

Op blz. 28. **Pterostichus cristatus** Dufour. Deze soort is thans met zekerheid uit Nederland bekend geworden.

De heer *W. Hellinga* ving bij Vaals (Zuid-Limburg), in het laatst van Mei, een ♀, dat welwillend voor mijne collectie werd afgestaan, waarvoor veel dank. No. 198^{bis} van de Nieuwe Naamlijst.

- „ „ 46. **Peltodytes caesus** Dfts. Uit het aanspoelsel van Herwen, Dec. 1926, een **nigrino**. No. 369 van de N.N.
- „ „ 59. **Agabus guttatus** Payk. De a. **unicolor** Dalla Torre werd, met een aantal exemplaren van het type, door den heer *B. H. Klynstra*, bij Oldenzaal, juni, gevangen en, met mijn dank, voor mijne collectie aangeboden. No. 428 van de N.N.
- „ „ 59. **Agabus unguicularis** Thoms. Een ♂ werd door den heer *F. T. Valck Lucassen* aan den Plasmolen bij Mook, Juli, en ook een paar exemplaren door den heer *B. H. Klynstra*, bij Denekamp, juni, gevangen. Van beide heeren ontving ik, met mijn dank, een exemplaar.
- Deze soort is het naast verwant aan **A. affinis** Payk., doch onderscheidt zich doordat de zijden van het lichaam meer afgerond zijn, door de smalle tongvormige zijvleugels van het metasternum en doordat de groote einddoorn der achterschenen evenlang als-, bij **affinis** veel korter dan het 1e tarslid is (*Reitter* zegt in zijne *Fauna Germanica* bij vergissing juist het omgekeerde). De Heer *Klynstra* wijst ook op de eerste 4 sprietleedjes, die rood zijn, de laatste 7 echter met zwart uiteinde; ook zijn de sprietleedjes iets korter en een weinig meer afgerond dan bij **affinis**¹⁾. No. 429^{bis} van de N.N.
- „ „ 60. **Agabus undulatus** Schrnk. De heer *F. T. Valck Lucassen* ving bij Brummen, Juli, de a. **interruptus** Schilsky, welk exemplaar welwillend voor mijne collectie bestemd werd. No. 438 van de N.N.
- „ „ 93. **Atheta (Aleuonota) splendens** Kz. Een exemplaar, door Dr. *A. Reclaire*, in Mei bij

1) In Col. Neerl. III is, bij vergissing, *A. unguicularis* Thoms. tweemaal vermeld, op blz. 59 en op blz. 60.

Hilversum gevangen, ontving ik, met mijn dank, voor mijne collectie.

No. 624^{bis} van de N.N.

- „ „ 118. **Staphylinus caesareus** Cederh. Bij nader onderzoek van een groot aantal exemplaren uit Nederland, door den heer *J. Sainte Claire Deville*, blijkt dat deze soort zeer zeldzaam is en slechts in de coll. *Mac Gillavry* (v. d. *Brandt*) uit Venlo en in de coll. *Uyppenboogaart* uit Nijmegen, beiden slechts in een enkel exemplaar, bewaard worden. Dr. *D. Mac Gillavry* was zoo genereus om zijn eenig exemplaar, dat wel is waar oud en niet frisch is, aan mij te geven, waarvoor veel dank. De vele andere exemplaren uit Nederland behooren tot **S. parummentosus** v. Stein (910^{bis} van de N.N.), welke als goede soort moet beschouwd worden. Het onderscheid der beide soorten is aldus:

Slapen goudgeel behaard. Sprieten iets langer en dunner, geheel roestrood ¹⁾). Halsschild even lang en breed als de dekschilden; iets glanzig; met matig dichte bestippeling, de tusschenruimten der stippels nagenoeg gelijk aan de doorsnede van dezen. Beharing op de dekschilden uitsluitend rossig. De goudgele vlekken op het achterlijf gemiddeld iets grooter dan bij de andere soort. Volgens *Ste. Claire Deville* is het buisvormige gedeelte van den penis iets langer dan het bolvormige, bijna cilindervormig en aan den top weinig of niet verbreed; de paramere²⁾ volkomen vlak en recht, over eene groote lengte versmald en aan den top toegespitst **caesareus** Cederh. Slapen evenals het overige gedeelte van den kop donker behaard, hoogstens met iets lichte-

1) Bij de var. (ab.) *Corporaali* Deville, uit Zuid-Frankrijk en Spanje, zijn de sprieten aan het uiteinde duidelijk gebruind.

2) Volgens K. W. Verhoeff zijn de beide parameren met elkaar vergroeid en vormen eene lange symmetrieke of asymmetrieke plaat.

ren schijn. Sprieten iets korter en dikker, altijd aan de tophelft duidelijk gebruind. Halsschild duidelijk korter en smaller dan de dekschilden, uiterst dicht bestippeld, geheel dof. Beharing der dekschilden gewoonlijk met zwartachtige haren vermengd, wat niet altijd scherp is waar te nemen. Het buisvormige gedeelte van den penis iets korter dan het bolvormige, aan de basis ingesnoerd, naar den top verbreed; de paramere iets S-vormig gebogen en naar den top weinig toegespitst . . . **parumtomentosus** v. Stein.

- „ „ 127. **Cryptobium fracticorne** Payk. Met mijn dank ontving ik een exemplaar van de a. **collare** Reitt., door den heer *F. T. Valck Lucassen* bij Laag Soeren gevangen. No. 1005 van de N. N.
- „ „ 162. **Euplectus Aubeanus** Reitt. Dr. *A. Reclaire* ving bij Beetsterzwaag, Aug., in een vermolmden boomstronk, drie exemplaren. Een ervan werd, met mijn dank, voor mijne collectie afgestaan. No. 1282^{bis} van de N. N.
- „ „ 185. **Liodes picea** Illig. De a. **flavipennis** Fleisch. werd door Dr. *Reclaire* bij Hilversum gevangen en welwillend voor mijne collectie bestemd. No. 1418 van de N. N.
- „ „ 186. **Liodes dubia** Kugel. No. 1419 van de N. N. **L. longipes** Schmidt wordt door Dr. *Fleischer* niet gelijk aan het type, maar als een vorm daarvan beschouwd, wat ook in „Col. Neerl. I. blz. 419” werd aangenomen. De bij deze soort gerekende a. **mixta** Fleisch. wordt thans door den auteur tot **L. obesa** Schmidt gebracht. No. 1420 van de N. N. Van Dr. *A. Reclaire* ontving ik, met mijn dank, een paar exemplaren uit Hilversum voor mijne collectie.
- „ „ 220. **Meligethes memnonius** Er. Mr. *D. L. Uyttenboogaart* ving bij Vaals, Mei, een exemplaar,

- dat, met mijn dank, voor mijne collectie werd aangeboden. No. 1822^{bis} van de N. N.
- „ „ 250. **Cathartus quadricollis** Guér. (cassiae Reiche, gemellatus Jacq. Duv.) Een ♂ en ♀ uit eene lading Cacao (Leidsche-Oranje-Nassauveem, Amsterdam). No. 1890^{bis} van de N. N.
- „ „ 256. **Litargus connexus** Fourcr. De als **lunatus** F. en **signatus** Panz. geduide aberr. zijn beiden bij Arnhem, eerstgenoemde ook bij Winterswijk, Kerkrade en Valkenburg gevangen. Door *Reitter* niet als aberr. beschouwd.
- „ „ 260. **Aphidecta obliterated** L. Een exemplaar uit Maastricht, in mijne collectie, vertoont op de achterhelft der dekschilden een aantal donkere stipvlekjes en is de M-vormige vlek op het halsschild zeer onduidelijk.
Bij een ander exemplaar, uit Eerbeek, zijn de dekschilden over het grootste gedeelte, dicht marmerecht, donker gevlekt, welke vlekken hier en daar, vooral aan het uiteinde, ineenvloeien. Bij nagenoeg of geheel ineenvloeiende donkere vlekken, krijgt men de ab. **Illigeri** Weise en **fumata** Weise. No. 2133 van de N. N.
- „ „ 263. **Coccinella conglobata** L. (**octodecimpunctata** Scop., Everts). Dr. *A. Reclaire* ving de a. **pineti** Weise bij Hilversum. Een exemplaar werd, met mijn dank, voor mijne collectie bestemd. No. 2144 van de N. N.
- „ „ 269. **Coccidula rufa** Hrht. De in Col. Neerl. III vermelde exemplaren uit Zeeburg, bij welke over de beide dekschilden eene meer of minder uitgebreide, onregelmatige zwarte vlek aanwezig is, kunnen tot de a. **plagiata** Gerh. gerekend worden. De zwarte kleur op de dekschilden begint met eene kleinere of grootere naadvlek, of is deze voor een deel van den naad afstaande, of is als eene donkere

streep meer over het midden der dekschilden gelegen (de eigenlijke a. **plagiata** Gerh., die ik niet uit Nederland zag). No. 2105 van de N.N.

- „ „ 270. **Scymnus nigrinus** Kugel. Van de var. **decipiens** Weise, bij welke de dijlijn tot aan den voorrand terug loopt, bezit ik een exemplaar, door mij, voor vele jaren, bij Wageningen gevangen. No. 2115 van de N.N.
- „ „ 330. **Elater praeustus** F. De a. **semiruber** Steph. werd, door den heer *C. J. Dixon*, bij Loosduinen, Mei, gevangen en voor mijne collectie aangeboden, waarvoor mijn dank. No. 2325 van de N.N.
- „ „ 343. **Helodes marginata**. F. De a. **nigricans** Schilsky werd door den heer *W. Hellinga*, bij Gronsveld, Mei, gevangen en, dank zijne vriendelijkheid, voor mijne collectie bestemd. No. 2335 van de N.N.
- „ „ 377. **Gnathocerus cornutus** F. Van den heer *B. H. Klynstra* ontving ik, met mijn dank, een **nigrino** uit Laag Soeren. No. 2527 van de N.N.
- „ „ 439. **Phylloocta tibialis** Suffr. *Mr. Dr. Uyttenboogaart* ving bij Denekamp, Juni, één exemplaar van de a. **coerulea** Weise, dat welwillend aan mij werd afgestaan. No. 2835 van de N.N.
- „ „ 538. **Phyllobius calcaratus** F. De door *Westhoff* (Die Käfer Westfalens 1882) beschreven var. (of a.) **nudus** blijkt aan mij thans, zeer terecht, tot deze soort te behooren en niet hetzelfde te zijn als var. **Fussi** Schilsky van **P. urticae** de Geer. Het exemplaar, dat ik thans te danken heb aan de vriendelijkheid van den heer *W. Hellinga*, werd bij Vaals, einde Mei, gevangen. Het lichaam is zwart, zonder schubjes en beharing, met geelroode

pooten ; de kenmerken beantwoorden overigens volkomen aan de beschrijving van **P. calcaratus** en niet aan die van **urticae**. No. 3048 van de N.N.

- „ „ 573. **Rhynchaenus (Orchestes) foliorum** Müll. (saliceti F.). Bij het type zijn alle dijen donker gekleurd, bij de a. **Sequensi** Stierl. de pooten geelrood, alleen de achterdijen donker. Deze laatste is de meest voorkomende vorm, het type komt mij voor zeldzaam te zijn. No. 3401 van de N.N.

Aangenaam werd ik verrast doordat Pater Dr. *E. Wasmann S. J.* zijn eenig Nederlandsch exemplaar van **Callicerus rigidicornis** Er. var. **fulvicornis** Eppelsh. en evenzoo van **Lamprinodes haematopterus** Kr. voor mijne collectie ten geschenke gaf; daarvoor mijn grooten dank.

De in No. 147 van de Entomol. Berichten vermelde **Coccotrupes dactyliperda** F., uit dadelpitten van de Canarische eilanden medegebracht, blijkt te zijn (wat ik reeds eenigszins vermoedde) eene andere soort, welke door Forstrat *Eggers* thans als eene nieuwe soort herkend en als *Uytenboogaarti*, tot een nieuw genus **Dactylotrupes** *Eggers*, beschreven werd. De soort werd niet door handelsverkeer met waren geïmporteerd. De ware **C. dactyliperda** F., welke wel in de pitten van bedorven Algerijnsche dadels en in betelnoten voorkomt, is in verscheidene Europeesche havenplaatsen, maar nog niet in Nederland, waargenomen.

ED. EVERTS.

DEN HAAG.

Bijdrage tot de kennis der Coleoptera-fauna van Zeeland.

(Vervolg en slot.)

2278 *Selatosomus bipustulatus* L., Lako