

onderdeelen (families, secties enz.) hare plaats niet zouden kunnen vinden in bestaande tijdschriften, zooals b.v. de Heer WILLEMSE dat deed voor de *Orthoptera* en de Heer LIEFTINCK voor de *Odonata*.

De mij te „grootsche” opzet heeft mij dus tot mijn afwijzend antwoord geleid. Merkwaardig genoeg, vernam ik eenigen tijd later van Prof. DE MEIJERE, wien dezelfde vraag gedaan was, dat bij hem dezelfde overweging tot hetzelfde besluit geleid had.

„Der langen Rede kurzer Sinn” is dus, dat ik het verschijnen van systematisch-faunistische publicaties op entomologisch gebied — mits uitstekend bewerkt — van ganser harte toejuich, doch dat ik niet inzie, dat daartoe deze onderneming noodig was. In het slagen dier onderneming als geheel heb ik dan ook weinig vertrouwen, aangezien m.i. de moeilijkheden, die zich zullen voordoen, althans op entomologisch gebied, verre onderschat zijn.

Schovenhorst, Putten G., Maart 1928. J. TH. OUDEMANS.

### Lepidoptera van Texel.

Naar aanleiding van het artikel van den Heer Lieftinck in de Ent. Ber., Deel III, p. 321, geef ik hier een lijstje van de Lepidoptera, op bovengenoemd eiland door mij verzameld gedurende de eerste helft der maand Augustus 1927. Zeer volledig is het zeker niet, daar door verschillende omstandigheden het verzamelen voor mij slechts bijzaak kon zijn.

*Pieris rapae* L.

*Pieris napi* L. 1 ♀ eierlegend te Burg.

*Pyrameis atalanta* L. Rupsen zeer talrijk over het geheele eiland.

*Pyrameis cardui* L. Verscheidene exemplaren, zoowel bij Koog als bij Oude Schild.

*Argynnis niobe* L. In de duinen, bij „Fontein's Nol” ten Z. van Koog en bij „de Muy” ten N. van het dorpje.

*Satyrus semele* L. Overal in de duinen gewoon.

*Pararge megera* L. Bij Koog en Oude Schild.

*Epinephele jurtina* L. Vooral in de duinen tusschen Koog en „de Muy” zeer gewoon.

*Coenonympha pamphilus* L.

*Lycaena icarus* Rott. Oude Schild, Burg en Koog. Vooral bij 't laatste dorp op een luw plekje aan den voet der duinen zeer gewoon. Hier ook 1 ♂ der ab. *candiope* Brgstr. (= *iphis* Meig.), met één wortelvlak aan de onderzijde der voorvleugels, in plaats van twee.

*Augiades comma* L. 1 ex. bij Koog.

*Euproctis chryssorrhoea* L. Talrijke ex. op duindoorn bij Koog, verscheidene ♀♀ naast de door haar afgezette eieren.

*Lasiocampa quercus* L. Gewoon in de duinen bij Koog; alleen ♂♂ gezien, die wild rondvlogen, vaak tegen sterken wind in over de toppen der eerste duinenrij.

*Acronicta tridens* Schiff. Burg, 1 ex. ♂.

*Agrotis strigula* Thnb. 2 ex, ♂ en ♀, 's middags op bloeiende heide vliëgend aan den voet der duinen bij „Fontein's Nol”.

*Agrotis pronuba* L. Burg, enkele ex.

*Agrotis comes* Hb. 1 ♀, Burg.

*Hadena monoglypha* Hufn. Burg, gewoon.

*Hadena secalis* Bjerck. Burg, zeer gewoon in een tuin op pruimeboomen, die sterk bezet waren met bladluizen, (vooral de vorm *rufa-albo* Tutt, verder *rufa-flavo* Tutt, *I-niger-albo* Tutt en *lugens-flavo* Tutt).

*Plusia gamma* L. Gewoon. Burg en Koog.

*Hypena proboscidalis* L. 1 ♂, Burg.

*Acidalia virgularia* Hb. Verscheidene ex., Burg.

*Acidalia immutata* L. Enkele ex. in duinpannen bij Koog.

*Ortholitha plumbaria* F. Op heide bij „Fontein's Nol” ein Koog. Gewoon.

*Ortholitha limitata* Sc. Koog en Oude Schild.

*Lygris prunata* L. Gewoon in een tuin in Burg.

*Lygris testata* L. In duinpannen bij Koog.

*Larentia bicolorata* Hufn. 3 ex., Burg.

*Larentia fluctuata* L. 2 ex., Burg.

*Larentia bilineata* L. Gewoon in de duinen.

*Larentia comitata* L. 2 ex., Burg.

*Abraxas grossulariata* L. Burg. Gewoon in een tuin.

*Ourapteryx sambucaria* L. 2 ex., Burg.

*Spilosoma lubricipeda* L. 1 ♀, Burg.

*Hipocrita jacobaeae* L. Rupsen in de duinen.

*Zygaena filipendulae* L. Gewoon bij Koog, aan den voet der duinen.

Amsterdam.

B. J. LEMPKE.

### **Megachile maritima Kirby.**

In No. 161 der Ent. Ber., wordt in het opstel van den Heer LIEFTINCK: „Kort bericht over insecten van het eiland Texel”, op p. 323 o.a. ook genoemd *Megachile maritima* Kirby, waarvan aldaar op 4 September 1927 twee ♂♂ werden aangetroffen, en wel op bloeienden Rubus. De Heer LIEFTINCK voegde er aan toe: „*M. maritima* schijnt een laatvliegende soort te zijn”. In eene hieraan weder toegevoegde noot wordt eene mededeeling van ALFKEN aangehaald uit „Die Insekten des Memmert”, 1924, waarin deze kundige Hymenopterooloog het een en ander over deze soort vertelt. Daarin komt o.a. voor: „Am 4. Aug. 1918 sah ich um 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr schon ein ♀ mit voller Blütenstaubtracht von *Lycium* davonfliegen. Die ♂♂ waren ebenfals von Ende Juli bis Anfang August saugend an *Lotus* und *Lycium* tätig”. Ten slotte zegt de Heer LIEFTINCK, dat de Heer BOUWMAN hem schreef, dat de late vang-datum wel te wijten zou zijn aan den kouden zomer 1927.

Aangezien *M. maritima* hier op Schovenhorst, Putten G., eene veelvuldig voorkomende soort is, waarvan zich meer dan 50 ex. in mijne verzameling bevinden, besloot ik, eens na te gaan, wat daaruit ten opzichte van den vliegtijd valt te besluiten.

De vindplaatsen en getallen zijn: Putten 34 ex., Garderen 1, Bloemendaal 1, Velsen 1, Wijk aan Zee 7, Driebergen 1, Plasmolen 2, Venlo 5. Te zamen 52 ex. In het hier volgende zal ik, tenzij anders aangegeven, alleen van de Puttensche ex. notitie nemen, aangezien de kleine getallen der andere vindplaatsen geene goede vergelijking toelaten.

Te Putten ving ik de soort in de jaren 1885, 1898, 1902, 1906, 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1922. De vroegste vangdatum was voor de mannetjes 18 Juni, de laatste 19 Juli. Voor de wijfjes waren deze data 29 Juni en 2 September.

Volgens de maanden gerangschikt, waren de getallen de volgende: