

benoemd tot lid van het permanente executieve comité der Internationale congressen voor Entomologie, ter vervulling van de vacature, ontstaan door het overlijden van Prof. H. SKINNER te Philadelphia.

### Eerstvolgend congres.

Besloten werd, het eerstvolgend congres te houden te Parijs in 1932, waar dan de SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE haar 100-jarig bestaan zal vieren.

Moge het succes daarvan dat van het congres te Ithaca evenaren!

---

### NEGENDE VERVOLG OP HET AANHANGSEL IN „COLLEOPTERA NEERLANDICA III”

#### (Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna XLVII).

---

- Op blz. 1. **Cicindela campestris** L. a. **5-maculata** Beuth. faun. nov. ab. Door den heer *P. van der Wiel* bij Vaals (Limb.) Mei, gevangen en met mijn dank voor mijne collectie bestemd. De tweede stip op de dekschilden is bijna verdwenen. No. 1 van de Nieuwe Naamlijst.
- „ „ 27. **Pterostichus cupreus** L. De a. **nigrovirens** Letzn. werd door den heer *A. van Roon Jr.* bij Groesbeek, Juni, gevangen en met dank aan mij gegeven. No. 179 van de N.N.
- „ „ 34. **Harpalus flavicornis** Dej. Een ♂ werd door Dr. *Rüschkamp S. J.* bij Valkenburg, April, gevangen en met mijn dank voor mijne collectie bestemd No. 279<sup>bis</sup> van de N.N.
- „ „ 59. **Agabus unguicularis** Thoms. De heer *Valck Lucassen* maakte mij opmerkzaam op eene uiterst fijne, puntige verhevenheid, waardoor de achterrand van het halsschild, vóór het schildje, iets opgetrokken is en daarachter eene meer of minder duidelijke kleine inham zich vertoont.
- Bij vele exemplaren van de naast verwante

**A. affinis** Payk. is dit duidelijk te zien, bij anderen zeer weinig. Bij **A. unguicularis** daarentegen is de achterrand volkomen vlak. No. 429<sup>bis</sup> van de N.N.

- „ „ 120. **Philonthus temporalis** Muls. et Rey. Ook door Dr. *Rüschkamp S. J.* bij Valkenburg, Mei, gevangen en met dank voor mijne collectie aangeboden. No. 939<sup>bis</sup> van de N.N.
- „ „ 158. **Phyllocrepa puberula** Eppelsh. i.l. (Bernhauer). Door den heer *P. van der Wiel*, in één enkel exemplaar, bij Vaals, Mei, gevangen en met mijn dank, voor mijne collectie afgegaan.
- Deze soort is naverwant aan *P. nigra* Grav. en *floralis* Payk., maar gemakkelijk te onderscheiden door de geheel roode sprieten en de duidelijke, vrij dichte beharing der bovenzijde. Lengte  $3\frac{1}{5}$  m.m. No. 1242<sup>bis</sup> van de N.N.
- „ „ 258. **Chilocorus bipustulatus** L. Exemplaren, bij welke een geelroode dwarsband, in twee ongelijke helften gedeeld is, van welke die het dichtst bij den naad als band (door versmelting der twee binnenste vlekjes) behouden blijft, terwijl de andere buitenste slechts een stip vormt, zijn op vele plaatsen (vooral in Gelderland) verzameld. Dit zou dan zijn de a. **exclamationis** Depoli, welke uit Zuid-Europa beschreven is, maar zwartbruine dekschilden heeft, terwijl de in ons land gevangen exemplaren volkomen zwarte dekschilden vertoonen. No. 2127 van de N.N.
- Op blz. 259. **Exochomus quadripustulatus** L. De a. **sexpustulatus** Kr. (eenigszins immaatuur) bij Den Haag (*Leesberg*), in mijne collectie. No. 2129 van de N.N.
- „ „ „ **Hippodamia tredecimpunctata** L. De in Col. Nederl. III p. 259 vermelde a. **borealis** Weise, uit Tiel, is meer een tusschenvorm van a. **sellata** Weise en **borealis** Weise. Op

- de dekschilden vloeien alle zwarte vlekken ineen; slechts de scutellair-vlekjes blijven vrij; de rand- en naadzoom, met enkele inhammen, blijven geelrood. Halsschild zwart, met een C-vormigen gelen zijrand. Kop zwart, clypeus en bovenlip geel. Bij de a. **fulvomarginata** Winglm. (niet uit Nederland bekend) zijn ook de scutellair-vlekjes met de andere zwarte vlekken samengevloed. No. 2130 van de N.N.
- „ „ 260. **Anisosticta 19-punctata** L. De a. **Mac Gillavryi** Everts (de stippen 4 en 7 versmolten), door *Dr. D. Mac Gillavry* bij Heerde gevangen en welwillend voor mijne collectie bestemd. Niet bij *Leopold Mader's* „Evidenz der paläarktischen Coccinelliden und ihrer Aberrationen” vermeld. No. 2134 van de N.N.
- „ „ 331. **Elater ferrugineus** Lac. De a. **ferrugatus** Reitt. is bij Arnhem, Grave en in Zuid-Limburg gevangen. No. 2328 van de N.N.
- „ „ 362. **Thanasimus rufipes** Brahm. Een typisch exemplaar werd, door den Heer *K. J. Bernet Kempers*, bij de Lutte nabij Oldenzaal, Juni, gevangen en welwillend voor mijne collectie bestemd. No. 2431<sup>bis</sup> van de N.N.
- „ „ 381. **Conopalpus testaceus** Oliv. De var. **flavicollis** Gyll., door den Heer *K. J. Bernet Kempers*, in het Haagsche Bosch, Juni, uit takken gekweekt en, met mijn dank, voor mijne collectie afgestaan. No. 2557 van de N.N.
- „ „ 430. **Cryptocephalus parvulus** Müll. De a. **Klettei** Gerh. (barbareae Steph.) bij Breda en Geulle (Limburg). No. 2767 van de N.N.
- „ „ 435. **Chrysomela fuliginosa** Oliv. De heer *P. van der Wiel* bericht mij dat hij, bij Schin op Geul (Limburg), het type gevangen en voor mij bestemd heeft. De zijkanten der dekschilden zijn nog een weinig blauw getint, bestippling fijner dan bij *a. galii* Weise. No. 2808 van de N.N.



- „ „ 567. **Thryogenes (Eirirrhinus) Fiorii** Zumpt. Deze nieuwe soort werd in het Coleopterologisch Centralblatt van *Hans Wagner*, Berlin, 2 Band 1927—28, Heft 5—6, 30 April 1928, door stud. phil. *F. Zumpt* beschreven. Zij onderscheidt zich gemakkelijk van **T. festucae** Hrbst., **nereis** Payk. en **scirrhosus** Gyll., van terzijde gezien, door de sterk neergedrukte aanhechtingsplaats voor den snuit aan den kop, welke ontstaat, doordat de snuit ongeveer in het midden van den kop aanzit en met het voorhoofd daardoor een stompen hoek vormt. Bij de andere genoemde soorten zit de snuit hooger ingeplant en vormt met het voorhoofd eene gelijkmatige (**nereis Payk.**) of nagenoeg gelijkmatige ronding. In habitus gelijkt zij op **nereis**, het halsschild is echter duidelijk langer dan breed en nagenoeg even zoo breed als de dekschilden, terwijl deze bij **nereis** bijna vierkant en iets smaller dan de dekschilden is; ook zijn de pooten slanker en is de snuit dunner, welke meer die van **festucae** naderen. De schubjes staan niet zoo dicht opeen als bij beide genoemde soorten en zijn ook veel slanker en meer gestrekt, herinneren meer aan die van **scirrhosus**, bij welke de beide witte vlekken op het topgedeelte der dekschilden bij **Fiorii** op dezelfde wijze ontwikkeld zijn. Het 4e-7e sprietlid nagenoeg vierkant, bij **nereis** duidelijk verbreed. Op de schijf van het halsschild met groote, niet rimpelig samenhangende stippels bezet, wier tusschenruimten vrij smal, maar evenals bij **nereis** glad en glanzig zijn; bij de andere twee soorten staan de stippels dichter opeen, met zeer smalle, bijna niet glanzige tusschenruimten; langs de zijden met langgestrekte, nagenoeg haarvormige schubjes, die op de onderzijde echter door meer of minder ronde vervangen worden.

Dekschilden als bij **nereis**, derhalve in het topgedeelte geen breede welving, van welke zij zich plotseling schuin naar den top versmallen zooals bij **festucae** en **scirrhosus**. De kleur is rood- tot donkerbruin, met witgele schubjes. Lengte 3-4½ mm. (zonder den snuit).

Door **Zumpt** uit Berlijn, Hamburg en Italië opgegeven en ook exemplaren uit Naarden en Ankeveen, voor Dr. *A. Reclaire*, gedetermineerd. In mijne collectie vond ik, onder **T. scirrhosus** staande, exemplaren uit den Haag, Zeeburg, Rotterdam, Hilversum en Kortenhoef.

No. 3343<sup>bis</sup> van de N.N.

- „ „ 623. **Apion flavipes** Payk. Dr. *A. Reclaire* ving bij Baarn, Oct., eene merkwaardige afwijking, met gekromde schenen. Of dit als eene monstruositeit (zooals *H. Wagner* meent) te beschouwen is, waag ik niet te beslissen. Het exemplaar werd met dank voor mijne collectie bestemd. Ik bezit een exemplaar uit Erlangen (Beieren), bij hetwelk de beide voorschenen niet zoo volkomen recht zijn als in den regel. No. 3476 van de N.N.

- „ „ 629. **Apion oblongum** Gyll., in Schönh. Genera et spec. Curcul. V. 421.

Van deze, uit de Krim beschreven, soort, welke door *J. Desbrochers des Loges* (Le Frélon T. III 1893, p. 62) ook van het gebied aan den Bosphorus vermeld wordt, is door Dr. *A. Reclaire* bij Hilversum, Mei, in één enkel ♀ exemplaar gevangen en met dank voor mijne collectie bestemd. De determinatie was van *Hans Wagner*, waarmede ik volkomen instem. Deze soort is het naast verwant aan **A. curtirostre** Germ. (humile Germ.), dof zwart en evenzoo behaard. Zij is grooter dan de grootste ♀♀ van deze soort en opvallend door den meer gestrekten vorm en de naar het uiteinde weinig, althans veel minder verbrede

dekschilden. Snuit iets langer dan het halschild, ook iets langer dan bij **curtirostre** ♀; bijna recht, tusschen de inplanting der sprieten met een klein groefje. Halsschild eenigszins cilindervormig en wat meer verlengd. No. 3486<sup>bis</sup> van de N.N.

### Acarologische Aanteekeningen XCIV.

**Haemolaelaps mohrae nov. spec.** In nest van *Microtus arvalis*, Holstein, Maart, en Glückstadt (Holst.), Febr., ERNA MOHR legit.

Nympha II. Rugschild achter coxae IV met zijdelingsche, ondiepe, maar scherpe kerf; alle borstels kort. Epistoom vóór afgerond, hoogstens aldaar onduidelijk drie-lobbig (mijne exemplaren zijn echter door acidum lacticum vermoedelijk een weinig vervormd.) — Digitus fixus mandibuli met opvallend tibiaalorgaan; dit bijna zoolang als de digitus zelf; proximale helft van dat orgaan ovaal; distale helft haakvormig gebogen. — Ambulacrum I opvallend grooter dan II-IV. — Ventraal: sternimetasternale vóór zeer breed, tusschen coxae I en II den lichaamsrand bereikend, tusschen coxae IV versmald, even voorbij coxae IV reikend, aldaar afgerond. Anaalschild afgerond driehoekig. Malae der maxillicoxae uit minstens 24 stralende laciniae bestaande, waarvan, ter weerszijden, de 5 zijdelingsche stomp. Hypopharynx tongvormig, met zeer flauw ingebogen zijden.

Femina. Opvallend breed:  $\frac{2}{3}$  van de lengte. — Ventraal. Praesterni-sternale vóór breed, tusschen coxae I en II den lichaamsrand bereikend; lengte  $\frac{2}{3}$  der breedte Geniti-ventraalschild met slechts 2 borstels; het ronde ventrale gedeelte ter weerszijden door 2 borstels geflankeerd. — Hypopharynx tongvormig, niet zijdelings ingebogen. — Ter weerszijden van het tritosternum een halfcirkelvormig uitsteeksel van het praesternale. — Overigens als Nympha II.

Mas. Opvallend slank: breedte  $\frac{1}{2}$  der lengte. De randharen van het rugschild langer dan bij het ♀. — Digitus fixus kort, hyalien, slipachtig; merkwaardig is, dat het tòch een tibiaalorgaan draagt, dat denzelfden vorm: