

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

De Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

No. 125 (herdruk).

Deel VI.

1 Mei 1922.

INHOUD: DR. D. MAC GILLAVRY, *Hydrometra gracilenta* Horv. forma *macroptera* in Nederland. — DR. D. MAC GILLAVRY, Aanteekeningen over *Rhynchota Homoptera* II. — C. A. L. SMITS VAN BURGST, Chalcididae, nieuw voor de Nederlandsche Fauna. — DR. J. TH. OUDEMANS, *Vespa austriaca* Panz. in Nederland. — DR. J. TH. OUDEMANS, *Kermes roboris* (Fourcr.) Fern. in Nederland (Coccina). — JHR. DR. ED. EVERTS, Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna, XXXIX. — DR. J. TH. OUDEMANS, *Megastigmus spermotrophus* Wachtl, de vernieler van het zaad van *Pseudotsuga Douglasi* Carr. (Chalcididae). — DR. J. TH. OUDEMANS, De Wespen-enquête 1921.

De Bibliotheek der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, Plantage Middenlaan 15, Amsterdam, is geopend op werkdagen van 9—12 en van 1—5 uur, des Zaterdags slechts van 9—12 uur.

***Hydrometra gracilenta* Horv. forma *macroptera* in Nederland.**

Mijn mededeeling over *Hydrometra gracilenta* Horv. op de wintervergadering te Amsterdam 1920 (T. v. E. LXIII. p. XXIX.), was de aanleiding, dat langs onze moerassen scherp naar dit diertje werd uitgezien, waardoor ik reeds te Winterswijk (T. v. E. LXIV. 1921. p. XLVIII.) kon mededeelen, dat *H. gracilenta* Horv. zonder twijfel in ons land voorkomt. Er werd toen tevens op gewezen, dat van dit genus ook macroptere exemplaren voorkomen en ook dit kon, ten minste voor *Hydrometra stagnorum* L., voor Nederland bevestigd worden, door de vangst van een macropteer wijfje te Nunspeet.

Nu ontving ik van DR. A. RECLAIRE onder eenige *H. stagnorum*, een enkel exemplaar van *H. gracilenta* Horv., door hem 6 Juni 1921 te Halsteren (N. Br.) gevangen en blijkt dit een macropter wijfje te zijn. (Zie ook T. v. E., LXV, 1922, p. XI).

Om de serie compleet te maken, moeten nu nog alleen van beide soorten macroptere mannetjes ontdekt worden. Daarbij mag opgemerkt worden, dat HORVATH wel macroptere exemplaren van *gracilenta* kende, maar uitsluitend van het vrouwelijk geslacht en uitdrukkelijk mededeelt, dat deze macroptere exemplaren zeer zeldzaam zijn. Hoe de verhouding van macroptere en brachyptere vormen bij *H. stagnorum* is, kan ik nog nergens vermeld vinden.

Daar de opgaf der vindplaatsen van *H. gracilenta* l. c. ongelukkig incompleet is, door het uitvallen van een woord, geef ik deze hier nogmaals :

Forma brachyptera: 1 ♂. Mook (L.). 25 VIII 1905. (Mc. G.); 1 ♀. Oisterwijk (N.-Br.). IV 1919. (v. d. Wiel); 1 ♀. Leeuwen (G.). V 1920. (v. d. Wiel).

Forma macroptera: 1 ♀. Halsteren (N.-Br.) 6 VI 1921. (Reclaire).

Amsterdam.

D. MAC GILLAVRY.

Aanteekeningen over Rhynchota Homoptera II.

Sinds mijn eerste aanteekeningen op dit gebied zijn twaalf jaren verlopen (zie Entom. Ber. Deel III, No 52, 1 Maart 1910, p. 43). In dien tijd heb ik meermalen in tweestrijd verkeer, of ik dit werk zou hervatten, dan wel nog wachten zou, om dan ineens een nieuwe naamlijst der Nederlandsche *Homoptera* te geven. Het bezwaar was niet gebrek aan gegevens, wel echter de moeilijkheid der determinatie van vele voorwerpen. Daar dit laatste bezwaar nog steeds niet opgeheven is, het aantal der nieuwe aanwinsten voor onze fauna, waarvan de bestemming voldoende zeker is, echter sterk is toegenomen, meen ik verstandig te doen, het reeds bereikte in deze nieuwe reeks vast te leggen.

Uit het volgende blijkt, dat onze *Homoptera*-fauna weder met 31 soorten is toegenomen. Hoe belangrijk dit aantal ook is, toch is het werkelijk bij ons voorkomende