

- \* *Typhlocyba nitidula* F. Hilversum, 8 en 9, De Meyere.
- \* *Typhlocyba candidula* KB. Gemert (N.-Br) Licent.
- \* *Typhlocyba crataegi* DOUGL.? Nijmegen, 6 en Oosterbeek 8, Bierman, nog door Bierman gedetermineerd.

Amsterdam.

D. MAC GILLAVRY.

## Chalcididae, nieuw voor de Nederlandsche fauna.

*Habrocytus tenuicornis* FÖRSTER. Onder de sluipwespen, welke in de laatste jaren in mijn laboratorium uit door *Anthonomus pomorum* L. beschadigde appelknoppen te voorschijn kwamen, neemt voornoemde *Chalcidide* eene eerste plaats in. Zij schijnt in ons land algemeen verbreid te zijn. Ik kweekte haar te gelijker tijd met *Pimpla pomorum* Ratz. en *Bracon discoidens* Wesm. Het zal nog uitgemaakt moeten worden, of *Habrocytus tenuicornis* een parasiet van de 1ste, dan wel van de 2de macht is. Ik verkreeg dit sluipwespje in groote hoeveelheden uit materiaal, afkomstig uit Winschoten, Diepenveen, Gendringen, Elst, Ede, Zeist, Boskoop, Goes en Kloetinge.

*Alaptus pallidicornis* FÖRSTER. Dit sluipwespje, na verwant aan *Litus nigriceps*, eene door mij indertijd in de E. B. beschreven nieuwe soort, ontving ik verleden jaar in eenige exemplaren van den Phytopathologischen Dienst ter determinatie. Het werd gekweekt uit *Psociden*-eieren, welke onder Naarden op een perziktakje gevonden waren.

*Blastothrix Schönherri* WESTWOOD. Evenals de vorige, behoort deze parasiet tot de miniatuur-sluipwespjes. Lengte nauwelijks 1 m.M. Ook deze soort ontving ik in eenige exemplaren van den Phytopathologischen Dienst, alwaar zij gekweekt werd uit het schildluisje *Phenacoccus aceris* CKLL. (*Dactylopius vagabundus* SCHILL), aangetroffen in eene perzikkas nabij Wateringen (Z.-H.).

Beek, bij Breda.

C. A. L. SMITS VAN BURGST.

October 1921.