

vangen, waarvan later eene lijst in de Entomol. Berichten zal gegeven worden. Vooral moet hier vermeld worden *Anthonomus sorbi* Germ., welke soort, in groot aantal, op bloeienden meidoorn gevangen werd; Friesland is tot nog toe de eenige provincie, waar deze soort gevonden is (vroeger een paar bij Drachten door MR. D. L. UYTENBOOGAART).

Den Haag.

ED. EVERTS.

Twee uiterst zeldzame Keversoorten, na vele jaren teruggevonden.

De heer C. J. DIXON ving in eene houtstapelplaats bij Loosduinen, op eiken- en beukenblokken, afkomstig van omgewaaide boomen uit het Haagsche Bosch, een ongewoon klein ♂ van *Lymexylon navale* F. (met dank ontvangen), welke soort eenmaal, in één enkel exemplaar (in 1906), door wijlen MR. A. F. A. LEESBERG, tegen een eikestam in het Haagsche bosch werd aangetroffen; sedert bezocht ondergeteekende dien boom tallooze malen, zonder iets van de soort te bemerken.

De andere soort, *Psendopsis sulcata* Newm., voor ongeveer 12 jaren in eenige exemplaren in het Haagsche bosch uit beschimmelde dorre bladeren, takjes, stukjes hout en verdord gras gezeefd en sedert, niettegenstaande herhaaldelijk onderzoek, niet meer teruggevonden, werd door ondergeteekende in de eerste week van Augustus van dit jaar wederom, in 3 exemplaren, aangetroffen.

De insectenzeef en de photeklektor deden hier goeden dienst. Bij het uitzeven van plantenresten moet men vooral zorg dragen, niet alleen de losse massa te bewerken, maar vooral ook het residu op den bodem uit te schudden; het doelmatigst daartoe is te nemen een klein stofblik benevens een plankje als krabber en het opgenomene telkens in de insectenzeef te doen.

Wijlen EDMUND REITTER (zie: Fauna Germanica, Die Käfer des Deutschen Reiches, I Bd. 1908, blz. 45) was niet overtuigd van de doelmatigheid van den photeklektor (door ORMAY in Hermannstadt uitgedacht en sedert zeer verbeterd), doch verkoos het uitzoeken „priesenweise” op wit karton. Voor ondergeteekende is de photeklektor een ideaal toestel, wanneer men hem op doelmatige wijze weet te gebruiken.

De daarbij behorende wijdmondsflesch, voor $\frac{1}{3}$ met zuiveren alcohol gevuld, moet hermetisch onder aan de trechtervormige opening sluiten; het toestel moet ruim half gevuld worden met zeefsel, het deksel met een flanellen lap goed aangedrukt en vooral moet elken dag, na een tik op het deksel, opdat de daaronder zittende insecten neervallen, deze een oogenblik opgelicht worden, om den gevormden alcohol damp te verwijderen en een nieuwen, drogen flanellen lap aan te brengen; wat met een mes omroeren is aan te bevelen. Aldus kan het toestel dagen achtereen werken, waarbij, na vernieuwing van een aanhangend glas met alcohol, telkens nog insecten uitloopen en uitvliegen; zelfs zijn popjes in de massa in dien tijd nog uitgekomen. Na een 8-tal dagen kan men het toestel uit elkaar nemen en het residu op den bodem nog op wit papier nader uitzoeken. De insecten in den alcohol kunnen door een trechter met filtreerpapier verzameld worden.

Fleschjes met suikerbier (stout met veel suiker, surrogaat van uitvloeiende boomsappen), opgehangen in de holten van boomen, of tusschen dicht klimop, tusschen boomwortels ingegraven of aan houten schuttingen, onder rieten daken, bevestigd en dan na 14 dagen of 3 weken, goed gekurkt, naar huis medegenomen en met filtreerpapier behandeld, bieden nog wel eens verrassingen aan.

Den Haag

ED. EVERTS.

Habrobracon brevicornis Wesm. faunae n. sp.

Tegen een raampje eener schuur onder Beek, gemeente Prinsenhage, ontdekte ik einde Julij van dit jaar een vrouwelijk exemplaar van bovenvermelde sluipwespensoort, naar welke ik al jaren gezocht heb, in de veronderstelling, dat zij, in Engeland, België en Duitschland inheemsch zijnde, ook in Nederland zoude voorkomen.

Van dezen vertegenwoordiger der *Bracon*-groep, een slechts enkele m.m. lang diertje, is het wijfje dadelijk te herkennen aan hare korte sprieten (vandaar de naam *brevicornis*) en beide seksen aan den vorm der tweede cubitaalcel der voorvleugels, welke aanmerkelijk kleiner is dan de derde, doordat haar bovenader korter is dan de