

- Op Blz. 333. **Hypnoidus dermestoides** Hrbst. (2007). Het type (met ongevlekte dekschilden) bij Berg (Limb.) Juli, door Prof. Dr. *Max Weber* gevangen en aan mij afgestaan, werd met dank aanvaard.
- „ „ 412. **Tetropium Gabrieli** Weise (2363bis). De a. **Crawshayi** Sharp, met het type, uit *Larix*, bij de Steeg, Mei, door den Heer *F. W. Burger* verkregen. Met dank van elk een exemplaar ten geschenke ontvangen.
- „ „ 572. **Rhynchaenus (Orchestes) alni** L. (2886). Een niet volkomen uitgekleurd exemplaar van de a. **connatus** Gerh., uit Loosduinen, Juli, met dank van den Heer *C. J. Dixon* ontvangen.
- „ „ 629. **Apion violaceum** Kirby (3164). Een exemplaar van de a. **harcyniae** Hubenth., met olijfgroene dekschilden, door den heer *P. van der Wiel* bij Leeuwen (Geld.), Sept., gevangen en met dank voor mijne collectie aanvaard.

Den Haag.

ED. EVERTS.

TWEEDE LIJST VAN  
VERBETERINGEN EN DRUKFOUTEN  
in „**Coleoptera Neerlandica**” III.

- Op bladz. XVI, regel 15 v. b. staat: *Cryptophagus*; lees *Cryptophagus*.
- „ „ 1, regel 24 v. b. staat: *4-maculata* lees *5-maculata*.
- „ „ 26, regel 2 v. o. achter „evenals” dit bij Laplandsche enz. lezen.
- „ „ 33, regel 4 v. o.: ♂ uit den Haag; in Col. Neerl. I blz. 89 staat bij vergissing: ♀.
- „ „ 41, regel 3 v. b. moet **C. macularis** niet gespatieerd zijn.
- „ „ 44, regel 18 v. b. staat: *Scribe*; lees: *Scriba*.
- „ „ 45, regel 5 v. b. moet **nomax** gespatieerd zijn.

- Op Blz. 46, regel 7 v. o. staat: Zaitsev; lees Zaitzev.
- „ „ 56, regel 23 v. o. evenzoo.
- „ „ 60, regel 9 v. b. staat: *A. unguicularis* Ths., was reeds op blz. 59 vermeld.
- „ „ 60, regel 12 v. o. staat: *atterrimus*; lees: *aterrimus*.
- „ „ 60, regel 12 v. b. staat: *plaeopterus*; lees: *phaeopterus*.
- „ „ 111, regel 6 v. b. staat: *inquisitur*; lees: *inquisitor*.
- „ „ 111, regel 7 v. b. staat: *subrubes*; lees: *subruber*.
- „ „ 168, regel 29 v. b. van het woordje veel is de 1 uitgevallen.
- „ „ 194, regel 16 v. o. staat: (atomaroids); lees: atomaroides).
- „ „ 195, regel 2 v. o. staat: *punctatun*; lees: *punctatum*.
- „ „ 199, regel 26 v. o. staat: *Laetitiae*; lees: *Laetitia*.
- „ „ 212, regel 16 v. b. bij **Olibrus Baudueri** Flach is de lengte  $1\frac{1}{5}$ — $1\frac{1}{2}$  m.m.
- „ „ 249, regel 22 v. o. is bij *ferrugineus* de s uitgevallen.
- „ „ 249, regel 14 v. o. **Hyliota** moet niet gespatieerd zijn.
- „ „ 255, regel 4 v. b. *Ilendus* Casey moet tusschen ( ).
- „ „ 271, regel 6 v. o. staat: *Anale* sterniet geheel wit behaard; dit moet zijn: eveneens met een zwart vlekje aan weerszijden (zie: Col. Neerl. I blz. 605, noot <sup>2</sup>).
- „ „ 277, regel 4 v. b. het \* staat bij *Czwalina* in plaats van bij *dubius*.
- „ „ 278, regel 21 v. b. staat: *Czawlina*; lees: *Czwalina*.
- „ „ 321, regel 26 v. b. De aldaar geciteerde auteur heet toch *Obenberger* en niet *Oberberger* (zie: blz. 668, Verbeteringen).
- „ „ 406, regel 2 v. b. de lengte van *Nivellia sanguinosa* Gyll. is 11—14 m.m.
- „ „ 407, regel 25 v. o. staat: **dat** in den regel; lees: **die** enz.
- „ „ 421, regel 27 v. b. de lengte van **Phytoecia molybdaena** Dalm. is  $4\frac{1}{2}$ —7 m.m.
- „ „ 427, regel 31 v. o. de lengte van **Labidostomis lusitanica** Germ. is  $5\frac{1}{2}$ —10 m.m.
- „ „ 450, regel 1 v. o. van *Halticiden* is de 1 uitgevallen.

Op Blz. 480, regel 2 v. b. staat: *Kutschera*; lees: *Kutscherae* of nog beter *Kutschera*.

„ „ 528, regel 32 v. o. staat: *fulla*; lees: *fullo*.

„ „ 533, regel 16 v. o. staat: *subaudus*; lees: *sabaudus*.

„ „ 550, regel 29 v. b. staat: *altermans*; lees: *alternans*.

„ „ 567, regel 5 v. b. staat: *Bn* het type, moet zijn *Bij* het type.

„ „ 621, regel 8 v. b. moet *ulicis* gespatieerd zijn.

„ „ 650b, regel 10 v. b. moet „duidelijke” vervallen.

Den Haag.

ED. EVERTS.

### ***Dermestes* *carnivorus* F. te Amsterdam.**

In een tabakspakhuis te Amsterdam vonden wij in een partijtje van 13 balen (seroenen) uit Cuba geïmporteerde ruwe tabak, een vrij groot aantal exemplaren van *Dermestes* *carnivorus* F. (versicolor Cast.), in gezelschap van *D. vulpinus* F.

De larven hadden zich bij voorkeur ingevreten in de koppen der bundels, d.z. de plaatsen, die in de seroenen het dichtst aan de oppervlakte zitten. Zij hadden daar holten gevreten en zich daarin verpopt. Bij het uitpluizen vonden wij dan daarin de uitgekomen kevers, zittende onder de pophuid en de laatste larvehuid. Vele kevers waren ook uitgekropen en liepen buiten op de seroenen rond.

Waarvan zij leven, is niet uitgemaakt, maar het invreten der volwassen larven in de tabaksbundels is boven twijfel. Uit het feit, dat op 7 Augustus imagines, poppen en volwassen larven werden aangetroffen en op 30 Augustus alleen imagines en dat, behalve de vrij ruime popholten weinig of geene vreterij viel te constateeren, zou men besluiten, dat de larven niet hare geheele ontwikkeling in de tabak doorloopen hadden. Wellicht hebben zij zich eerst gevoed met beenderen, huiden of iets dergelijks en zich daarna ter verpopping begeven in de tabak, die misschien er naast opgeslagen stond. REITTER zegt van *Dermestes* in *Fauna germanica* III, p. 148: „Die Arten samt ihren Larven