

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

De Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

No. 129.

Deel VI.

1 Januari 1923.

Adres der Redactie :

DR. J. TH. OUDEMANS, SCHOVENHORST, PUTTEN (G.).

INHOUD : DR. D. MAC GILLAVRY, iets over het Subgenus *Macrocorixa*. — DR. J. TH. OUDEMANS, Coleoptera, aangetroffen op eene doode kraai. — PROF. DR. W. ROEPKE, Boekbespreking. — R. VAN EECKE, Eenige correcties in en aanvullingen tot de „Eerste bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Thysanoptera”. — DR. D. MAC GILLAVRY, Eenige opmerkingen over het dooden van insecten. — DR. A. C. OUDEMANS, Eene invasie van *Sminthurus*. — DR. A. C. OUDEMANS, Acarologische Aanteekeningen LXX. — J. H. JURRIAANSE, Insectendoozen en -kasten. — N. E. V. afd. Z.-Holland.

De Bibliotheek der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, Plantage Middenlaan 15, Amsterdam, is geopend op werkdagen van 9—12 en van 1—5 uur, des Zaterdags slechts van 9—12 uur.

Iets over het Subgenus *Macrocorixa*.

Zooals ik reeds vroeger bericht heb, is *Corixa carinata* Sahlb. in ons land reeds op drie plaatsen gevangen, o.a. in de Waschkolk te Nunspeet. Dit jaar heb ik getracht, het dier weder te vangen, wat mij echter tot nu toe niet gelukte. Wel werden verscheidene soorten van het geslacht *Corixa* opgehaald en daaronder meerdere exemplaren van het subgenus *Macrocorixa*. Bij determinatie bleken alle drie de soorten aanwezig, n.l. *C. Geoffroyi* Leach, *C. dentipes* Ths. en *C. affinis* Leach. Dit samen voorkomen is nog

weinig, mogelijk nog niet waargenomen, weshalve het wel vermelding verdient, al denk ik, dat nauwkeurig toezien wel zal leeren, dat het niet zoo ongewoon is.

In 't algemeen geldt *C. affinis* als levend in brak water, en bij ons zijn ook wel alle vindplaatsen tot nu toe aldus. Het verst van zee gevangen is een exemplaar, dat ik van den heer KOORNNEEF uit Baarn ontving, maar ook van dit exemplaar is het gevonden zijn in brak water niet uitgesloten. De Waschkolk is echter zoet water. KUHLGATZ in de „Süsswasserfauna Deutschlands” zegt er van: „Bekannt von Schlesien, Thüringen, Schleswig-Holstein, Borkum. Auch in Brackwasser. Im übrigen: England, Frankreich, Mittelmeerküsten.”

Wat *Corixa dentipes* betreft, hiervan heb ik reeds vermeld, dat deze wel tot de vennenfauna behoort, naar aanleiding van de vangst in een ven onder Apeldoorn; de vangst hier te Nunspeet bevestigt dit.

Tevens lijkt het mij niet ondienstig, er op te wijzen, dat KUHLGATZ zich vergist, waar hij als tegenstelling tusschen *Geoffroyi* en *dentipes* zegt: „Tibien der Mittelbeine bei der Basis ohne Zahn: ♂ *Geoffroyi*. . . Tibien der Mittelbeine bei der Basis mit einem, aus einem Bündel dicht aneinander gelagerten Borsten bestehenden Zahn: ♂ *dentipes*.” De gespatieerd gedrukte woorden dienen te vervallen en bijgevoegd te worden bij het daarop volgende: „Schenkel der Mittelbeine bei der Spitze mit einem Zahn.” Deze tand toch draagt op het distale, afhellende gedeelte van den tand den bovengenoemden haarbundel. Het merkwaardige is, dat de toestand door zijn Fig. 76, waarnaar hij verwijst, volkomen goed wordt weergegeven. Verder geeft hij de lengten aldus aan: *C. Geoffroyi* 13-15 m.M., *C. dentipes* 9—11 m.M. en *C. affinis* 9—11 m.M. Naar mijne ervaring met de nederlandse exemplaren, ontlopen de eerste twee soorten elkander slechts zeer weinig in grootte. Ten slotte kan ik zijne opgaven over de voorhoofdsgroef der mannetjes nog derwijze aanvullen, dat deze bij het mannetje van *C. dentipes* zeer oppervlakkig en breed is, aan de zijden iets dieper en aldaar grof gepunkteerd; zij strekt zich slechts tot den voorrand der oogen uit.

De voorhoofdsgroef van het *affinis*-mannetje is diep, scherp begrensd, reikt tot ver tusschen de oogen en is opvallend sterk behaard.

Nunspeet, Augustus 1922.

D. MAC GILLAVRY.

Coleoptera, aangetroffen op eene doode kraai.

In Mei 1917 vond ik hier op Schovenhorst, Putten (G.), eene pas geschoten doode kraai en besloot na te gaan, welke kevers daarop zouden afkomen in de eerste, de tweede, de derde week enz., vermoedend, dat het voortschrijdend stadium van ontbinding allengs verschillende keversoorten zou aanlokken, of dezelfde soort in verschillende getalsterkte.

Ik legde den dooden vogel, met een koperdraad aan een in den grond geslagen paaltje bevestigd (tegen het wegsleepen door katten of andere roofdieren), op een open, onbegroeid plekje in een border, die den vollen zonneshijn genoot en begon het onderzoek na een paar dagen op 13 Mei. Ik hield afzonderlijk, wat ik van 13 tot 19 Mei verzamelde, dito van 20 tot 26 Mei en eindelijk van 27 Mei tot 9 Juni. De eerste perioden omvatten dus ééne week, de laatste twee weken. Daarna werd het verzamelen niet meer voortgezet.

Met mijn vriend EVERTS sprak ik eenigen tijd later af, dat ik hem de verzamelde kevers zou zenden en hij die voor mij zou determineeren; het heeft echter tot nu toe geduurd, alvorens ik tot de toezending overging, daar de fleschjes mij uit het oog waren geraakt. Met eene week ontving ik reeds de lijst der soorten en maak onzen coleopterologischen nestor — met mijn welgemeenden dank — een compliment over zijne voortvarendheid!

Hier volgt de lijst der soorten, met opgave van het aantal exemplaren van elke soort in de drie perioden.