

R; mit gelben Vorderrandadern. Costa wahrscheinlich (denn die Spitzen der Flügel sind abgebrochen) nicht ganz 0,5 der Flügellänge erreichend, sehr kurz bewimpert; Abschnitte wie $8\frac{1}{2} : 4 : 1$. Mediastinalis stark verkümmert, der 1. Längsader nahe anliegend und nur eine gerade verlaufende und frei in der Fläche endigende Falte bildend. Gabel etwas spitz. 4. Längsader in ihrer Nähe entspringend gleichmässig, so weit sichtbar, nach vorn konkav. 7. Längsader den Rand erreichend. Schwinger gelbbraun mit dunklerem Fleck auf der Oberseite. — Länge des Tieres 2 m.m.

Habitat bei der brasiliianischen Wanderameise *Eciton burchelli*. Nach 1 nachträglich trocken präparierten Alkoholexemplare beschrieben, das ich der Güte des Herrn Prof. Dr. Reichensperger (Freiburg) verdanke. Holotype in meiner Sammlung.

Valkenburg, 25 April 1923.

H. SCHMITZ S. J.

Eene nieuwe Bladwesp voor Nederland.

Op 30 April 1923 nam ik, als voedsel voor eene rups, van eene eikestruik, staande in een dennenbosch hier op Schovenhorst, een takje met enige bladeren mede naar huis. Aldaar bleek mij, dat onder tegen een der blaadjes eene bladwesp zat, die ik niet kende. Determinatie met ENSLINS bekende werk „Die Tenthredinoidea Mitteleuropas“ wees uit, dat het een ♀ was van *Thrinax macula* Kl., eene voor onze fauna nieuwe soort, die volgens ENSLIN nog slechts in Engeland, Duitschland en Zweden is waargenomen en waarvan de larve onbekend is. Herhaald afkloppen der eikestruiken leverde geen tweede exemplaar op.

Schovenhorst, Putten (G.), Mei 1923.

J. TH. OUDEMANS.

Verhuisd:

J. LINDEMANS, van 2de Res. Boezemstraat 34a. naar Boezemlaan 15b. Rotterdam.