

# ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

De Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

No 135.

Deel VI.

1 Januari 1924.

---

*Adres der Redactie:*

DR. J. Th. OUDEMANS, SCHOVENHORST, PUTTEN (G.).

---

INHOUD: DR. A. C. OUDEMANS, Autobiografieën van Entomologen. — DR. A. C. OUDEMANS, Analytical Key for the Classification of Families and Genera of Diacrotricha Oudms. 1906 (Acari). — G. A. GRAAF BENTINCK, Larentia variata Schiff. en Larentia obeliscata Hbn. — DR. D. MAC GILLAVRY, Aanvulling van eenige vroegere diagnosen. — C. A. L. SMITS VAN BURGST, Een afdoend middel tegen beschadiging van wollen stoffen en pelderijen door motlarven. — C. A. L. SMITS VAN BURGST, iets over Immunitet bij Insecten tegen infectie door parasitaire klassegenooten.

---

**De Bibliotheek der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, Plantage Middenlaan 15, Amsterdam,** is geopend op werkdagen van 9—12 en van 1—5 uur, des Zaterdag slechts van 9—12 uur.

---

## **Autobiografieën van Entomologen.**

DR. ENBRIC STRAND, Hoogleraar aan de Universiteit te Riga, adres: Zoologisches Institut, Puskivra bülwars 9, Riga, verzamelt sedert jaren stof voor een Biografisch-Entomologen-Lexicon, dat in eenige deelen het licht zal zien. Het zal biografieën en autobiografieën bevatten van Entomologen en Arachnologen van alle landen en uit alle tijden. Die van overledenen zijn voor het grootste deel reeds gereed. Voor de levenden is hij wel op autobiographieën aangewezen. Hij doet hierbij een beroep op Nederlandsche Entomologen, die op wetenschappelijk gebied reeds iets gepubliceerd, of verzamelingen aangelegd hebben, hem zoo spoedig mogelijk hunne autobiographieën

toe te zenden. Zoo veel mogelijk zullen deze in taal en vorm onveranderd opgenomen worden. De publicatie van dit grootsche werk is verzekerd. Behoef ik het nog warm aan te bevelen?

Arnhem.

A. C. OUDEMANS.

## Analytical Key for the Classification of Families and Genera of Diacrotricha Oudms. 1906 (Acari.)

### Cohors Diacrotricha Oudms. 1906.

- A. 1. Skin polished, or dull, or chagrined, or rough, or scaly, only in a few hypopi and nymphae partly finely striated, or wrinkled. Larvae usually with „Bruststiele” or „Urstigmata”.
- B. 1. Body more or less *Tyroglyphus*-shaped; skin polished, seldom finely granulated; mandibles normal, chelate.
- C. 1. Ambulacra with caruncle and movable claw, both sessile. *Tyroglyphidae* DONN. 1868.
- C. 2. Ambulacra with claw only.
- D. 1. Claw of legs I and II sessile. *Rhizoglyphidae* OUDMS. 1923.
- D. 2. Claw of legs I and II on flexible peduncle arising from side of tarsus. *Lentungulidae* BERL. 1897.
- C. 3. Ambulacra with small caruncle only. *Nanacaridae* OUDMS. 1923.
- C. 4. Ambulacra with caruncle, on the distal half, or on the end of which the claw is attached.
- D. 1. With propodosomatic shield; epimera I free; *Mealiidae* OUDMS. 1923.
- D. 2. With propodosomatic shield; epimera I joined to sternum. *Winterschmidtidae* OUDMS. 1923.
- D. 3. Without propodosomatic shield; skin moreover weak and polished. *Carpoglyphidae* OUDMS. 1923.