

B. 2. Without line of demarcation between propodo-and hysterosoma; hind part of propodosoma with a transverse row of 2 hairs only (?)

C. 1. Idiosoma lozenge-shaped or oval; of the gnathosoma only one third is visible from above; legs of about equal strength; legs I and II marginal; ♂ with suckers to the sides of the anus. *Dermaleichus* KOCH 1841.

C. 2. Idiosoma long, oval, top backward; gnathosoma plainly visible, almost marginal; legs marginal, in ♀ of about equal strength, in ♂ legs IV much thicker; ♂ with postanal suckers and posteriorly bifid. *Dicanestrinia* BERL. 1911.

Arnhem.

A. C. OUDEMANS.

Larentia variata Schiff. en Larentia obeliscata Hbn.

In het Verslag van de 55ste Wintervergadering der Ned. Ent. Ver. van 19 Feb. 1922 te 's-Gravenhage, maakte ik op blz. XXIV vermelding van de vangst van een ex. van de zeldzaam voorkomende type van *Larentia variata* SCHIFF., welke zeer sterk afwijkt van de algemeene var. *obeliscata* HBN. Toen dit verslag eenige maanden later in drukvorm verscheen, zag ik onderaan blz. XXIV de volgende opmerking staan: »*Cidaria obeliscata* HBN. wordt door PROUT, den bewerker der Geometridae in SEITZ, „Die Gross Schmetterlinge der Erde”, voor eene afzonderlijke soort gehouden. J. TH. O.”

Deze interessante opmerking noopte mij deze zaak nader te onderzoeken, en wel in Duitschland, waar kweekproeven van bovengenoemde soorten genomen zijn.

Bij mijne persoonlijke bezoeken aan de musea te München en Frankfort a/M., waar ik dit onderwerp nader onderzocht, kreeg ik van de deskundigen aldaar de volledige

bevestiging, dat kweekproeven in alle opzichten aangetoond hadden, dat wij niet met ééne soort en hare variëteit te doen hebben, doch met 2 geheel van elkaar gescheiden soorten, en dat door moderne entomologen de beide voornoemde soorten nooit meer als één en dezelfde mogen beschouwd worden.

Niet alleen verschillen de vlinders zelf zeer in gedaante, maar ook de rupsen. Eene nadere beschrijving van vlinder en rups te geven, acht ik overbodig, daar deze beide in het werk van SEITZ, deel IV, blz. 216 en 217, goed beschreven zijn; maar één belangrijk feit wil ik toch even vermelden, n.l., dat *Larentia variata* SCHIFF. als rups uitsluitend leeft op zilverspar (*Abies alba*=*pectinata*) en fijnspar (*Picea excelsa*) en, voor zoover bekend, nooit op den (*Pinus sylvestris*), terwijl de rups van *Larentia obeliscata* HBN. bijna uitsluitend op dezen laatsten boom gevonden wordt. Verder is de rups van *L. variata* SCHIFF. bijna niet te onderscheiden van die van *Larentia bicolorata* HUFN., verschilt echter aanmerkelijk van die van *L. obeliscata* HBN.

Derhalve hebben wij hier te doen met *Larentia variata* SCHIFF., zijnde eene nieuwe soort voor onze fauna, terwijl de zeer algemeene soort, die tot nog toe *Larentia variata* SCHIFF., met of zonder toevoeging van var. *obeliscata* HBN., genoemd werd, thans *Larentia obeliscata* HBN. moet heeten. ¹⁾

Overveen, Sept. 1923.

G. A. BENTINCK.

Aanvulling van eenige vroegere diagnosen.

1. *Trichoptera*.

Op de vergadering van 18 Februari 1923 te Utrecht (Tijdschr. v. Ent. LXVI, p. VIII) vermeldde ik de vangst van een *Trichopteron* f. n. sp. door den heer Koornneef te Apeldoorn, waarvan de diagnose niet vast stond. Sinds dien ontving ik het bekende werk van Mac Lachlan „A monographic Revision and Synopsis of Trichoptera of the European Fauna”. Met behulp daarvan meen ik wel als zeker te mogen aannemen, dat de naam moet zijn: *Halesus radiatus* Curt. ♀.

Verder werd ik door genoemd boek in staat gesteld, te bevestigen, dat de *Stenophylax*, door den heer Corporaal

¹⁾ Men zie over deze beide soorten ook: Tijdschr. v. Entom., Dl. LXVI, 1923, p. 162—163.