

Verder heeft arabiese gom de onaangename eigenschap, om na enige tijd donkerbruin te worden; ook ontwikkelt zich, tenminste hier in de tropen, bij vochtig weer wel eens schimmel op de gom.

Verleden jaar maakte de bekende myrmecoloog W. C. CRAWLEY, mij op een veel beter plakmiddel opmerkzaam, n.l. **Traganthgom**.

Hiervan lost men enige stukjes in kokend water op en voegt daarbij een paar druppels arabiese gom. Tegen schimmelvorming op de voorraad oplossing werd mij opgegeven een minimale hoeveelheid karbolzuur toe te voegen. Daar ik vroeger wel eens had waargenomen, dat zelfs sporen karbolzuur bij tere insekten verkleuring veroorzaken, verving ik deze met goed succes door tymol. Een heel klein stukje daarvan, tot poeder gewreven en door de opgeloste traganthgom geroerd, is voldoende. Het aangegeven middel, dat ik nu bijna sedert een jaar tot mijn grote voldoening gebruik, heeft de volgende voordeelen:

Het loslaten van de insekten komt niet meer voor, nóch bij droog, nóch bij vochtig weer. Bij de per post verzonden verzamelingen is, voor zover ik weet, niets los geraakt. Traganthgom droogt kleurloos op en wordt op de duur niet donker, terwijl ik van schimmelvorming niets meer gemerkt heb. Ik kan dan ook mijn kollega-insektenverzamelaars het middel ten zeerste aanbevelen.

Fort de Kock (Sumatra).

EDW. JACOBSON.

Vlindereieren, op een zeer abnormale plaats afgezet.

Dat vlinderwijfjes hare eieren soms afzetten op andere planten, dan die, welke gewoonlijk de voedselplant der rups vormen, is bekend (Zie o.a. Entomol. Berichten No. 106). In den herfst van 't vorig jaar kon ik echter iets waarnemen, dat nog sterker van den gewonen gang afweek. Ik zag n.l. een vlinder vlak onder een sterke booglamp zitten. Toen ik er bijklom, bleek het een ♀ exemplaar van *Ennomos autumnaria* Wernb. te zijn, dat bezig was op het hout van den paal hare eitjes af te zetten. Enkele tientallen had ze reeds op 't hout gedeponeed; thuis in

een doos geplaatst, zette ze na eenigen tijd haar bedrijf rustig voort. Zou het dier door het licht verblind zijn geweest en den paal voor een iep hebben gehouden?

Herwen bij Lobith.

L. H. SCHOLTEN.

Een tweede generatie van *Smerinthus populi* L. ?

In No. 113 van de Ent. Berichten verzoekt DR. J. TH. OUDEMANS, met het oog op de mogelijkheid van eene 2e generatie bij *Smerinthus populi*, den lezers dezer Berichten, om mededeeling hunner waarnemingen in verband hiermee. Daarom wil ik hier melding maken van de vangst van een ♂ exemplaar van genoemden vlinder op 12 Aug. 1922 (op licht). Of het werkelijk eene 2e generatie vertegenwoordigt, dan wel een achterblijver der gewone, enkelvoudige generatie is, zal moeilijk uit te maken zijn. De vlinders zijn bij mij evenwel nooit zoo laat uit de pop gekomen.

Herwen bij Lobith.

L. H. SCHOLTEN.

Vrouwelijke vlinders op kunstlicht afkomend.

In een aldus getiteld stukje verzoekt DR. J. TH. OUDEMANS in No. 77 der Entomologische Berichten om mededeeling van soortgelijke waarnemingen. In verband hiermee kan ik vermelden, dat op 5 Mei 1923, na een zeer warmen dag, 's avonds pl.m. 9 uur twee vrouwelijke vlinders van *Macrothylacia rubi* L. mijn kamer kwamen binnenvliegen. Een van deze dieren, die nog volkomen gaaf waren, had in elk geval gepaard, daar ik uit enkele eitjes er van rupsjes kreeg. Verder heb ik hier in de streek noch rupsen, noch vlinders dezer soort aangetroffen.

Herwen bij Lobith.

L. H. SCHOLTEN.

Boekaankondiging.

De Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Coleoptera, door Jhr. Dr. Ed. Everts.

Coleoptera Neerlandica. Nieuwe Naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied voorkomende Schildvleugelige Insecten, door Jhr. Ed. Everts, Phil. Dr.
Zutphen, W. J. Thieme & Cie., 1925.

In 1898 en 1903 verschenen de twee lijvige boekdeelen van de hand van Dr. EVERTS, den Nederlandschen Coleo-