

Psocoptera.Fam. *Psocidae*.**Psocus nebulosus** Steph. Valkenburg, 1. VIII. 1924.**Stenopsocus stigmaticus** Imh. et Labr. Valkenburg, 1. VIII. 1924.**Cyraphopsocus cruciatus** L. Valkenburg, 1. VIII. 1924.**Caecilius obsoletus** Steph. Valkenburg, 1. VIII. 1924.„ **flavidus** Steph. Valkenburg, 1. VIII. 1924.Fam. *Mesopsocidae*.**Elipsocus westwoodi** Mac Lachl. Amsterdam, 25. VII. 1924; Valkenburg, 1. VIII. 1924.**Trichoptera.**Fam. *Odontoceridae*.**Odontocerum albicorne** Scop. Valkenburg, 1. VIII. 1924.

Amsterdam, 26 Febr. 1925. D. MAC. GILLAVRY.

Chionaema boetonensis Jurr. et Lind.

Op pag. 35 van deel 62 (1920) van het T. v. E. staat eene beschrijving van **Chionaema boetonensis** Jurr. et Lind., met eene textfiguur op pag. 36. Deze soort komt niet alleen op Boeton voor, doch ook op Celebes, naast **Ch. fasciatella** Rothsch. Deze meening is gegrondvest op materiaal van Celebes, dat gedeeltelijk mij ter bewerking werd afgestaan door Dr. W. Kaudern en dat gedeeltelijk aan het museum werd geschonken door den heer P. J. van der Bergh. De bovengenoemde textfiguur is echter niet die van een ♀, doch van een ♂, daar de ♀♀ groter en breder zijn en bovendien egaal donker bruingrijs gekleurde achtervleugels hebben. Bij de ♂♂ is het basale gedeelte wit en alleen het marginale gedeelte licht bruingrijs getint, gelijk in de aangehaalde beschrijving genoemd is. Aan de onderzijde van den voorvleugel is aan de costa bovendien een eigenaardig zakvormig riekorgaan te zien, dat de ♀♀ niet hebben.

Merkwaardig is, dat deze op Celebes blijkbaar vrij gemeene soort zoo lang onbekend is gebleven.

Leiden, 17 April 1925.

R. VAN EECKE.