

2718. *Otiorrhynchus raucus* F. Bij het type is het haarschild schubkleed op de dekschilden eenigszins vlekkig, bij a. *tristis* F. geheel eenkleurig (met het type). *O. fulvus* F. werd beschreven naar immature bruinroode exemplaren.

2722. *Otiorrhynchus singularis* L. Bij a. *Chevrolati* BOHEM. zijn, volgens REITTER (*Fauna Germanica* V), op de tusschenruimten der dekschilden de korreltjes der regelmatige rijen dichter opeen geplaatst, dan bij het type.

Met het type; ik zag deze uit Vianen, Zuidlaren en Limburg.

3030^{bis}. *Ceuthorrhynchus millefolii* SCHULTZE (zie: Col. Neerl. II, blz. 687, noot 1). Twee exemplaren bij Doetinchem, Juni, door den heer P. VAN DER WIEL gevangen; een ervan werd welwillend voor mijne collectie afgestaan.

3037. *Ceuthorrhynchus ericae* GYLL. .Roode exemplaren zijn a. *Olceseii* PIC (*rufescens* SCHULTZE); zeldzaam. Deze zijn volkomen hard en uitgekleurd, terwijl meer zachte, lichtrood gekleurde exemplaren als immatuur moeten beschouwd worden.

3081. *Balaninus salicivorus* PAYK. Exemplaren, bij welke het halsschild niet gelijkmatig fijn behaard, maar aan weerszijden van een verdichten, strepig wit behaarden langsband voorzien is, zijn a. *pedemontanus* FUCHS; zeldzaam, met het type.

3082. *Balaninus pyrrhoceras* MRSH. Exemplaren, bij welke op de tusschenruimten der stippelijnen op de dekschilden slechts eene enkele rij van witgrijze haartjes voorhanden is, zijn a. *uniseriatus* REITTER, zeldzaam.

3114. *Apion distans* DESBR. a. *subcavifrons* DESBR. Één exemplaar bij Houthem (Limburg), Sept., door Dr. D. MAC GILLAVRY gevangen en welwillend voor mijne collectie afgestaan. Bij deze a. is het voorhoofd ingedrukt.

Den Haag.

ED. EVERTS.

Zeldzame en minder algemeene Coleoptera, op de excursies in Juni verzameld.

Bij Dieren.

Leistus spinibarbis F. a. *rufipes* CHAUD.

Bembidion argenteolum AHR. a. *chalybaeum* ST.

Phloeodroma concolor KR.

Neobisnius procerulus GRAV.

Amphotis marginata F.

Thalycra fervida OLIV.

Synchita juglandis F.

Bij Doetinchem.

Elaphrus Ullrichi W. REDTB.

Dyschirius politus DEJ.

» *intermedius* PUTZ.

Bembidion elongatum DEJ. (in aantal) en ab. c. *impustulatum*

SCHILSKY.

Atheta insecta THS.

Philonthus lepidus GRAV.

Stenus gallicus FAUV.

» *formicetorum* MANNH.

» *nigritulus* GYLL.

Phloeonomus planus PAYK.

Dendrophilus punctatus HRBST.

Rhizophagus politus HELLW.

Ips 4-punctatus OLIV.

Syncalypta paleata ER.

Linnichus sericeus DFTS.

Helophorus porculus BEDEL.

Elater elongatulus F.

Trachyphloeus aristatus GYLL.

Ceuthorrhynchus millefolii SCHULTZE. **Faunae nov. sp.**

» *scapularis* GYLL.

Bij Laag Keppel.

Stenus intricatus ER.

» *salinus* CH. BRIS.

Rhamnusium bicolor SCHRANK.

Bij Laag Soeren.

Atheta arenicola THS. (*germana* SHARP).

Quedius maurorufus GRAV.

Stenus intricatus ER.

Coninomus constrictus GYLL.

Abdera triguttata GYLL.

Den Haag.

ED. EVERTS.